# SUPPLÉMENT AUX FORMULAIRES PUBLIÉS JUSQU'À CE...

Digitized by Google

# SUPPLÉMENT

AUX

# FORMULAIRES

PUBLIÉS JUSQU'A CE JOUR,

**Contenant près de 300 Formules**

EXTRAITES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

**Qui ont paru en 1851.**

Digitized by Google

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE E. ET V. PENAUD FRÈRES,
RUE DU FAUBOURG-MONTMARTRE, 10.

Digitized by Google

# SUPPLÉMENT

AUX

# FORMULAIRES

PUBLIÉS JUSQU'A CE JOUR.

On sait que les formulaires publiés jusqu'ici sont très nombreux; qu'ils ont eu des éditions successives; mais que, malgré ces révisions, ils ne sont jamais au niveau des connaissances acquises, puisque, pendant l'impression de la nouvelle édition, on trouve dans les publications périodiques des formules nouvelles qui ne peuvent être insérées dans l'ouvrage publié.

Nous avions essayé, dans le *Journal de Chimie médicale,* de tenir nos lecteurs au courant des formules diverses qui deviennent du domaine public; mais nous avons bientôt reconnu que nous ne pouvions arriver au but que nous nous proposions d'atteindre. En effet, l'emploi d'une partie des feuilles du journal à cette publication ne nous a pas toujours permis de donner à nos collègues les faits et les nouvelles scientifiques qui, dans le journal, réclament un certain espace; en outre, l'abondance des matières arrêtait la publication des formules nouvelles, publication qui n'est pas sans importance, puisque les préparations prescrites par ces formules pouvaient être demandées aux pharmaciens nos abonnés, qui n'auraient pu les exécuter.

Pour obvier à ce double inconvénient, nous avons pris le parti de publier un *Supplément aux formulaires parus jusqu'ici*, et cette

Digitized by Google

publication, dans laquelle les formules porteront un *numéro d'ordre,* constituera plus tard une espèce de *Pharmacopée* ou de *Formulaire général,* qui, à l'aide d'une table, mettra le pharmacien à même de connaître les prescriptions successivement publiées, soit en France, soit à l'étranger.

Nous pensons que ces nouveaux efforts de la rédaction du *Journal de chimie médicale* démontrera à nos lecteurs que nous pensons sans cesse à améliorer une publication qui date de 1825, et dans laquelle nous avons cherché à faire connaître tous les progrès qui ont été faits, depuis vingt-sept ans, dans la chimie médicale, la toxicologie et la pharmacie pratique.

---

## AVIS.

Les feuilles du Formulaire devant paraître successivement, nous engageons nos abonnés à conserver les feuilles à part, lorsqu'ils font relier le Journal.

Digitized by Google

# FORMULAIRE.

1. **ACIDE** prussique anhydre.

(*Mode d'obtention de M. Woehler.*)

| | |
|---|---|
| Cyanure jaune ferrugineux, | 10 parties. |
| Acide sulfurique, | 7 — |
| Eau, | 14 — |

On place le mélange dans une cornue dont le col est élevé sous un angle de 45°, et légèrement refroidi, de manière que la majeure partie de l'eau dégagée puisse se condenser et retomber dans la cornue. On adapte à celle-ci, d'abord, un premier vase contenant une petite quantité de chlorure de calcium ou de cyanure de potassium en poudre grossière, puis un tube en U contenant du chlorure de calcium sec. L'un et l'autre sont placés dans un bain-marie contenant de l'eau à 86°. On termine l'appareil par un vase à condensation qu'on entoure d'un mélange refrigérent composé de glace et de sel.

2. **BIÈRE** antiscorbutique.

(*Formule de M. Van den Corput.*)

| | |
|---|---|
| Racine fraîche de raifort sauvage, | 2,000 grammes. |
| Racine d'acore odorant, | 500 — |
| Racine de gingembre, | 30 — |
| Baies de genièvre, | 1,500 — |
| Bourgeons de sapin secs, | 500 — |

Les racines de raifort doivent être râpées, et les autres substances coupées et contusées; puis le tout est mis en macération pendant quelques jours à une température convenable avec :

| | |
|---|---|
| Bière faible, | 600,000 grammes. |
| Pyromel (mélasse), | 3,000 — |

jusqu'à ce que la fermentation se soit établie; on passe ensuite. On dissout dans la colature :

| | |
|---|---|
| Bitartrate potassique, | 250 grammes. |

Et l'on ajoute :

| | |
|---|---|
| Alcoolat de moutarde, | 1,500 grammes. |

(10 gouttes d'essence par 500 grammes d'alcool à 90°.)

On peut substituer à la bière une infusion de 60 kilogrammes d'eau sur 6 kilogrammes d'orge germée.

Tonique diurétique puissant que l'on peut administrer aux doses de 50 à 200 grammes par jour.

Cette boisson, qui a quelques rapports avec la sapinette ou le spruceleer des Anglais, pourrait être utile dans la médecine des pauvres et surtout dans celle des marins; elle pourrait être mise en usage aussi bien comme diététique et prophylactique que comme remède contre les affections scorbutiques.

3. **BOCHETS** divers.

(*Formule de M. J.-E. Pétrequin.*)

On entend par bochets les vieux remèdes employés à l'Hôtel-Dieu de Lyon. On s'en sert comme dépuratifs dans les maladies lymphatiques et scrofuleuses de l'enfance et de l'adolescence.

*Bochet simple.* — Pour **1 litre** de tisane :

| | | |
|---|---|---|
| Gaïac rapé, Salsepareille, Squine, Sassafras, | ãã | 8 grammes. |
| Fraisier, | | 16 — |

*Bochet purgatif.* — On donne un ou deux verres du bochet suivant aux adolescents :

| | | |
|---|---|---|
| Gaïac, Salsepareille, Squine, | ãã | 8 grammes. |
| Sassafras, Fraisier, | | 16 — |
| Séné, Sel d'Epsom, | ãã | 5 — |
| Manne, | | 15 — |

F. S. A.

Digitized by Google

Pour les enfants de cinq à six ans :

| | | |
|---|---|---|
| Gaïac, Salsepareille, Squine, Sassafras, | ää | 8 grammes. |
| Fraisier, | | 16 — |
| Séné, Sel d'Epsom, | ää | 5 — |
| Manne, | | 30 — |

F. S. A.

Pour les adultes difficiles à purger :

| | | |
|---|---|---|
| Gaïac, Salsepareille, Squine, Sassafras, | | 8 grammes. |
| Fraisier, | | 16 — |
| Séné, | 10 à 12 | — |
| Sel d'Epsom, | | 10 — |
| Manne, | | 60 — |

F. S. A.

## 4. CATAPLASME narcotique.

| | |
|---|---|
| Pulpe de carotte cuite, | 500 grammes. |
| Poudre de ciguë, | 30 — |
| Opium, | 5 centigr. |

F. une pâte molle.

Topique calmant. Cancers superficiels, etc.

## 5. CHAULAGE des blés.

| | |
|---|---|
| Hydrochlorate d'ammoniaque, Chaux délitée, | ää 500 grammes. |

Le tout réduit en poudre et mis dans 25 litres d'urine pour 5 hectolitres de grain.

## 6. CIGARETTES arsenicales employées dans la laryngite.

(*Formule du docteur Trousseau.*)

On étend sur une feuille de papier blanc non collé la solution suivante :

| | |
|---|---|
| Arsenite de potasse, | 1 gramme. |
| Eau distillée, | 20 — |

Vous passez cette solution sur ce papier, de manière à ce qu'il en soit parfaitement imbibé.

On divise en vingt morceaux et l'on fume ce papier comme les cigarettes ordinaires. M. le docteur Trousseau dit qu'il l'a employé pour lui-même et qu'il s'en est bien trouvé.

## 7. COLLYRE contre les taies de la cornée.

(*Formule du docteur Fronmuller.*)

| | |
|---|---|
| Tannin, | 30 à 60 centigr. |
| Eau distillée, | 60 grammes. |
| Laudanum de Rousseau, | 2 à 4 grammes. |

Mêlez.

## 8. COLLYRE contre les taies de la cornée.

(*Formule de M. le docteur Fronmuller.*)

| | |
|---|---|
| Sulfate de cadmium, | 20 centigr. |
| Eau de roses, | 45 grammes. |
| Laudanum de Rousseau ou de Sydenham, selon les cas, | 2 à 6 grammes. |

## 9. COSMÉTIQUE dentifrice.

(*Formule de M. Barbier-Bergeron.*)

| | | |
|---|---|---|
| Charbon de bois de saule, | 170 | grammes. |
| Noir animal lavé et purifié, | 100 | — |
| Citron desséché et 2 clous de girofle en poudre, | 30 | — |
| Alun calciné, | 10 | — |
| Carbonate de magnésie, | 10 | — |
| Sulfate de quinine, | 5 | — |
| Baume du Pérou, | 5 | — |
| Miel fin épuré, | 170 | — |

Toutes les substances sont pulvérisées et mélangées, puis incorporées et mélangées de nouveau avec le miel.

(*Brevet d'invention de cinq ans*, 1843.)

## 10. EAU dépurative, nommée GATEAU RÉSINEUX.

(*Formule de M. Tracet et Comp., de Lyon.*)

| | | |
|---|---|---|
| Eau commune, claire et limpide, | 5 | litres. |

Mettez dedans :

| | | |
|---|---|---|
| Cannelle, | 15 gr. 62 | centigr. |
| Clous de girofle, | 15 — 62 | — |
| Noix muscade, | 1 — | |

Faites infuser le tout ensemble à froid pendant une demi-heure, après avoir concassé chaque ingrédient.

Ajoutez :

| | | |
|---|---|---|
| Eau de fleur d'oranger, | 1 | décilitre. |
| Anisette, | 1 | — |

Mêlez le tout ensemble, passez au travers d'un linge sans exprimer, et mettez en bouteilles bien bouchées.

Donnez le matin, à jeûn, entre les repas, et le soir, avant de se coucher, ainsi que la nuit, à dose d'un quart de verre à un verre.

Pendant le traitement, il faut s'abstenir entièrement de laitage, de haricots, et user modérément de toutes les crudités. (*Brevet d'invent. de cinq ans*; 1842.)

Digitized by Google

11. **EMPLÂTRE** agglutinatif de l'hôpital de Bavière, à Liége.

| | | |
|---|---|---|
| Minium, | 4,500 | grammes. |
| Huile de pavot, | 5,500 | — |
| Cire jaune, | 500 | — |
| Suif de mouton, | 500 | — |
| Colophane, | 700 | — |
| Térébenthine de Venise, | 1,500 | — |

L'huile est placée dans une bassine de cuivre, on la met sur un feu bien allumé, à l'aide d'un tamis en crin on y fait pleuvoir le minium en remuant continuellement avec une spatule de fer. Lorsque la matière monte légèrement en répandant une odeur empyreumatique, on enlève la bassine du feu et l'on continue à remuer. Lorsque l'effervescence est apaisée, on ajoute les autres ingrédients, en ayant soin de n'y verser la térébenthine qu'à la fin, et l'on remue jusqu'à refroidissement.

On place alors la bassine sur un feu très-doux pour détacher l'emplâtre et à l'aide de la spatule qui y est restée on l'enlève, on le met sur une pierre mouillée où il est arrosé avec de l'eau froide pendant quelques instants.

On étend l'emplâtre sur de la toile ou sur du coton comme pour le sparadrap ordinaire. — L'emplâtre de Bavière ne produit jamais d'irritation là où on l'applique.

12. **ÉTHER** nitrique.

(*Mode de préparation de James Grant.*)

| | | |
|---|---|---|
| Acide nitrique à 1° 36, | 4 | grammes. |
| Esprit-de-vin rectifié, | 310 | — |
| Poudre d'amidon, | 8 | — |

On mêle l'amidon avec 31 grammes d'esprit-de-vin dans un flacon de verre; on y ajoute l'acide nitrique, on chauffe s'il est nécessaire jusqu'à ce qu'on obtienne une légère effervescence, puis on fait passer l'éther nitreux dégagé, d'abord dans un flacon de lavage pour le débarrasser de l'acide qu'il retient, et ensuite dans un flacon contenant le reste de l'esprit-de-vin. L'action se développe quelquefois spontanément dans le flacon et se continue tranquillement pendant très-longtemps. Dans le cas où elle deviendrait trop violente, il faudrait plonger le flacon quelques minutes dans l'eau froide.

Pour obtenir l'éther nitreux, au lieu de le faire passer dans l'esprit-de-vin, on n'a qu'à le faire dessécher et le condenser dans un récipient bien refroidi.

13. **EXTRAIT** de belladone employé contre les coliques saturnines.

(*Formule du docteur Malherbe.*)

| | | |
|---|---|---|
| Premier jour : | | |
| Extrait de belladone, | 5 | centigr. |
| Poudre de belladone, | 10 | — |
| Deuxième jour : | | |
| Extrait de belladone, | 10 | — |
| Poudre de belladone, | 20 | — |
| Troisième jour : | | |
| Extrait de belladone, | 15 | — |
| Poudre de belladone, | 30 | — |

On prend en cinq fois la dose prescrite.

14. **FRICTIONS** contre l'acné varioliforme de la face et du col.

(*Formule du docteur Bazin.*)

| | | |
|---|---|---|
| Axonge, | 30 | grammes. |
| Carbonate de potasse, | 3 | — |

15. **FRICTIONS** contre l'eczema squameux.

(*Formule de M. le docteur Cazenave.*)

| | | |
|---|---|---|
| Sulfure de chaux, | 2 | grammes. |
| Axonge, | 30 | — |

Mêlez.

16. **GOUTTES** lithontriptiques de Palmieri (*liquore lithontriptico di Palmieri*).

La préparation de ce remède secret, qui jouit en Italie d'une grande réputation comme spécifique contre les affections lithiasiques des reins, consiste à faire bouillir 30 grammes de soufre en poudre dans 500 grammes d'eau de goudron. On maintient l'ébullition jusqu'à ce que la liqueur ait pris une belle couleur rouge rubis; on décante et on conserve pour l'usage.

La dose est de quinze à vingt gouttes par jour comme curatif, et de dix gouttes comme préventif.

17. **HUILE** de cade employée pour guérir l'acné varioliforme.

(*Formule du docteur Bazin.*)

On applique cette huile au moyen d'un pinceau de charpie tous les trois ou quatre jours.

18. **INJECTIONS** iodurées pour le traitement des abcès chauds.

(*Formule de M. Guibourt.*)

| | | |
|---|---|---|
| Eau, | 100 | parties. |

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| Alcool, | 50 | — |
| Iode, | 5 | — |
| Iodure de potassium, | 5 | — |

### 19. INJECTIONS d'ergotine contre l'épistaxis.

(*Formule de M. Bonjean.*)

| | |
|---|---|
| Ergotine pure, | 1 gramme. |
| Eau, | 30 grammes. |

M. le docteur Bonjean a adressé à l'Académie de médecine de Paris une note dans laquelle il fait ressortir tous les avantages qu'il a retirés de l'emploi de ces injections dans des cas d'hémorrhagies nasales. Il donne les détails suivants sur le mode d'administration :

Au moyen d'une petite seringue, vous injectez dans la narine par laquelle coule le sang la dissolution d'ergotine, et puis vous introduisez ensuite un tampon de charpie imbibée de cette même solution.

Enfin, on emploie quelquefois cette solution en boisson, à la dose de 15 grammes par 24 heures (50 centigrammes d'ergotine pure).

### 20. IODURE d'amidon.

(*Formule de M. Bonneroyn.*)

On délaye, dans un vase quelconque, 30 grammes d'amidon, dans une quantité suffisante d'eau distillée; ensuite on y ajoute peu à peu, en agitant sans cesse, 11 décigrammes d'iode dissous dans 6 à 20 grammes d'alcool; la liqueur change immédiatement de couleur et laisse précipiter de l'iodure d'amidon, qui est d'un beau bleu; on le recueille sur un filtre, on le fait sécher et on le conserve comme les autres iodures, dans un flacon bouché à l'émeri.

### 21. IODURE d'amidon soluble.

(*Formule de M. Magnes-Lahens.*)

| | |
|---|---|
| Amidon convenablement grillé, | 9 parties. |
| Iode, | 1 — |

On a préalablement réduit l'iode en poudre, puis ajouté peu à peu l'amidon, puis lavé à l'alcool ce mélange, pour en ôter le surplus d'iode qui pourrait s'y trouver.

### 22. LAVEMENT employé pour guérir la colique de plomb.

(*Formule de M. le docteur Aran.*)

| | |
|---|---|
| Chloroforme, | 20 gouttes. |
| Gomme adragante, | 8 grammes. |
| Jaune d'œuf, | N° 1. |
| Eau, | 125 grammes. |

### 23. LINIMENT contre les engelures.

| | |
|---|---|
| Sulfure de carbone, | 8 grammes. |
| Camphre, | 30 centigr. |
| Alcoolat de Fioraventi, | 30 grammes. |
| Baume du Pérou, | 4 — |

Frictions matin et soir.

### 24. LIQUEUR d'iodure double d'arsenic et de mercure.

(*Iodarsenite de mercure. — Liqueur de Donovant.*)

Cette préparation contient par gros un huitième de grain d'acide arsénieux, un quart de grain d'oxyde mercureux et quatre cinquièmes de grain d'iode.

La formule originale de Donovant est la suivante :

| | |
|---|---|
| Liqueur d'iodure d'arsenic et de mercure, | 8 grammes. |
| Eau distillée, | 100 — |
| Sirop de gingembre, | 15 — |

Divisez en quatre flacons. A prendre de une demie à une dose matin et soir.

M. Soubeiran a ainsi modifié cette formule de Donovant :

| | |
|---|---|
| Iodure de mercure (bi), | 1 gramme. |
| Iodure d'arsenic, | 1 — |
| Eau distillée, | 98 — |

### 25. LIQUEUR stomachique de M. Bossuet.

(*Recette pour 30 litres.*)

On mettra en macération pendant huit jours, dans 24 litres de bonne eau-de-vie de 19 à 20 degrés, les substances suivantes :

| | |
|---|---|
| Camomille, | 93 grammes. |
| Tilleul, | 93 — |
| Mélisse, | 118 — |
| Thé pékao, | 118 — |
| — des Pyrénées, | 118 — |
| Menthe en feuilles, | 118 — |
| Anis étoilé, | 93 — |
| Lierre terrestre, | 93 — |
| Verveine, | 31 — |
| Cannelle de Ceylan, | 46 — |
| Sauge, | 31 — |

Après huit jours de macération, on passera le tout dans une toile pour en extraire le marc, et on ajoutera au produit de la macération :

| | |
|---|---|
| Alcoolat d'angélique, | 6 onces. |
| — de cassis, | 6 — |
| — de genièvre, | 6 — |

Digitized by Google

On enlève 12 litres du liquide par distillation, et on mêle ces 12 litres qui marquent 28 à 29 degrés, avec un sirop préparé de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Eau de fontaine, | 4 litres. |
| — de rose, | 6 — |
| — de fleur d'oranger, | 2 — |
| Sucre raffiné, | 12 kilogr. |

On filtre et on met en bouteilles, que l'on bouche hermétiquement pour conserver le parfum.

(*Brevet d'inv. de dix ans*, 1838 à 1848.)

26. **LOTIONS** employées pour guérir l'acné varioliforme de la face et du col.

(*Formule du docteur Bazin.*)

| | |
|---|---|
| Eau, | 500 grammes. |
| Carbonate de potasse, | 2 — |

27. **LOTIONS** employées par le docteur Fronmuller dans les ophthalmies scrofuleuses.

| | |
|---|---|
| Coneine, | 20 centigr. |
| Eau distillée, | 20 grammes. |
| Alcool, | 13 décigr. |

Ces lotions se font plusieurs fois par jour autour de la paupière.

28. **LOTION** contre l'eczema squameux.

(*Formule du docteur Cazenave.*)

| | |
|---|---|
| Sous-borate de soude, | 2 grammes. |
| Eau distillée, | 500 — |

29. **PAPIER** antirhumatismal de Stèege.

| | |
|---|---|
| Gomme ammoniaque, | 250 grammes. |
| Térébenthine de Venise, | 60 — |
| Suif, | 30 — |
| Cire jaune, | 30 — |

Faites fondre, passez avec expression et ajoutez 1 p. de tartre stibié en poudre fine sur 9 p. de masse. Etendez le mélange sur du papier peu collé.

Utile dans le rhumatisme et dans tous les cas où une irritation locale à la peau est nécessaire. Il fait éprouver à la partie sur laquelle on l'applique une légère sensation de cuisson et y détermine l'apparition de pustules séreuses.

30. **PATE** dépilatoire.

(*Formule de M. Félix Boudet.*)

| | |
|---|---|
| Poudre d'amidon, | 10 grammes. |
| — de chaux vive, | 10 — |
| Hydro sulfate de soude, | 3 — |

Cette poudre, convertie en pâte par l'addition d'un peu d'eau, s'applique sur la partie que l'on veut dépiler, et remplace avantageusement les préparations arsénicales employées à cet usage.

31. **PETIT-LAIT** carbonique.

On trouve dans certains établissements de la Suisse et de l'Allemagne un petit-lait acidule que l'on fabrique en chargeant de gaz acide carbonique, à la manière ordinaire, le sérum du lait de chèvre coagulé au moyen de la présure de veau. Cette préparation, qui se conserve pendant un temps assez long dans des bouteilles solidement bouchées et ficelées, constitue une boisson tempérante agréable, qui convient aux estomacs délicats et fatigués par les excès de table.

32. **PILULES** de Berndt contre la glucosurie.

| | |
|---|---|
| Acétate de morphine, | 15 centigr. |
| Sulfate de cuivre ammoniacal, | 30 — |
| Extrait de fiel de bœuf, | 4 grammes. |
| Poudre de quassie amère, | 4 — |

F. S. A. des pilules de 10 centigr.

Cinq pilules matin et soir dans le diabète mellitique.

33. **PILULES** employées contre les maladies de la peau.

(*Formule du docteur Cazenave.*)

| | |
|---|---|
| Extrait alcoolique d'aconit, | 1 gramme. |
| Extrait de taraxacum, | 1 — |

Pour 40 pilules.

On en prend 1 ou 2 matin et soir.

34. **PILULES** contre la polyblennie pulmonaire chronique.

| | |
|---|---|
| Gomme ammoniaque, Extrait d'aunée, Soufre lavé, | âà 4 grammes. |
| Extrait de marrube, | Q. S. |

F. S. A. des pilules de 10 centigr.

Dans la bronchorrée des vieillards.

35. **PILULES** de santonine et de strychinine contre le tenia.

| | |
|---|---|
| Santonine pure, | 2 gr. 4 décigr. |
| Strychinine, | 7 centigr. ½ |
| Poudre de racine de jalap, | 12 grammes. |
| Sucre pulvérisé, | 15 — |

Mêlez et divisez en 24 pilules égales.

On prend 6 pilules par jour, de trois en

Digitized by Google

trois heures, et l'on fait prendre après un bouillon fait au beurre.

36. **PILULES** de soufre brun obtenu par fusion.

(*Formule du docteur Hannon.*)

| | |
|---|---|
| Soufre brun obtenu par fusion, | 2 grammes. |
| Div. S. A. en pil. de | 4 — |

On donne ces pilules à la dose de six à dix par jour dans les affections psoriques, telles que l'eczéma chronique et dans la bronchite chronique.

37. **PILULES** de soufre brun précipité.

(*Formule de M. le docteur Hannon.*)

| | |
|---|---|
| Soufre brun précipité, | 8 grammes. |
| Baume de Tolu, | Q. S. |
| Pour faire S. A. pill. | 16 centigr. |

Chaque pilule contient trois grains et demi de soufre.

On donne deux ou quatre de ces pilules par jour dans l'eczéma chronique, les affections squammeuses, dans les affections psoriques et les bronchites chroniques.

38. **PILULES** de Wutzer contre la spermatorrhée, accompagnée de faiblesse éréthistique des organes génitaux.

| | |
|---|---|
| Acide phosphorique solide, | 4 grammes. |
| Camphre en poudre, | 1 gr. 20 centigr. |
| Quinquina en poudre, | 4 grammes. |
| Extrait de cascarille, | Q. S. |

F. S. A. des pilules de 10 centigr., involvées dans de la poudre de cannelle.

Cinq pilules trois fois par jour.

39. **POMMADE** dit de Bajard.

(*Formule de M. Rogé.*)

| | |
|---|---|
| Soufre sublimé en poudre fine, | 8 grammes. |
| Jaune d'œuf, | N° 1. |
| Huile d'olive, | 40 grammes. |

A utiliser en frictions.

40. **POMMADE** d'extrait de belladone employée contre les coliques de plomb.

(*Formule du docteur Malherbe.*)

| | |
|---|---|
| Axonge, | 10 grammes. |
| Extrait de belladone, | 5 — |

Employez cette pommade en frictions sur l'abdomen.

41. **POMMADE** de camomille contre la gale.

(*Formule de M. Bazin.*)

| | |
|---|---|
| Poudre de camomille récente, Huile blanche, Axonge, | āā 500 grammes. |

Cette pommade, dit M. le docteur Bazin, guérit, en trois frictions, presque aussi vite que la pommade d'Helmérich, et elle a sur elle l'inestimable avantage de calmer instantanément les démangeaisons, et de ne produire aucune éruption secondaire.

42. **POMMADE** épispastique avec l'euphorbe.

(*Formule de M. Hainaut, de Courcelles*).

Cette pommade, qui est destinée aux personnes qui craignent les effets des pommades préparées avec les cantharides, s'obtient de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Racine d'euphorbe en poudre grossière, | 24 grammes. |
| Axonge de porc, | 453 — |
| Cire jaune ou blanche, | 46 — |

On fait digérer la racine et la graisse pendant deux heures, en remuant souvent; on passe avec expression et on fait fondre la cire, que l'on incorpore à l'axonge.

43. **POMMADE** contre la gale.

(*Formule de M. Van Hawendowk, de Newbergen* (*Hollande.*)

| | |
|---|---|
| Fleurs de soufre, | 125 grammes. |
| Poudre de racine d'hellèbore blanc, | 31 — |
| Nitrate de potasse, | 16 — |
| Savon vert, | 125 — |
| Axonge de porc, | 500 — |

Ce médicament est employé en frictions.

44. **POMMADE** d'iodure de plomb contre les végétations simples.

(*Formule du docteur Thiry.*)

| | |
|---|---|
| Iodure de plomb, | 4 grammes. |
| Axonge, | 31 — |

45. **POMMADE** employée dans les ophthalmies, par le docteur Fromuller.

| | |
|---|---|
| Tannin, | 40 à 60 centigr. |
| Axonge lavée, | 25 décigr. |

Digitized by Google

46. **POMMADE** contre le prurit.

(*Formule de M. le docteur Cazenave.*)

| | |
|---|---|
| Chloroforme, | 1 à 2 grammes. |
| Axonge, | 30 — |

Cette pommade est indiquée par M. le docteur Cazenave, comme ayant du succès contre le prurit qui accompagne certaines maladies de la peau, et notamment dans ces hypéresthésies si rebelles fixées à l'anus, à la vulve, aux parties génitales.

47. **POMMADE** de Stœge contre l'alopécie.

| | |
|---|---|
| Beurre de cacao, | 40 grammes. |
| Huile d'olive, | 20 — |
| Tannin, | 80 centigr. |
| Quinine, | 40 — |
| Alcoolat aromatique, | 8 grammes. |

F. S. A. Applications soir et matin contre la chute des cheveux.

48. **POTION** alumineuse contre la coqueluche.

A l'hôpital des Enfants, à Londres, l'alun est administré avec succès aux doses de 10 à 50 centigrammes toutes les quatre à six heures aux enfants de un à dix ans, affectés de bronchites spasmodiques.

La formule à laquelle on a ordinairement recours est celle qui suit :

| | |
|---|---|
| Sulfate d'alumine et de potasse, | 75 centigr. |
| Extrait de ciguë, | 60 — |
| Sirop de coquelicots, | 8 grammes. |
| Eau de fenouil, | 90 — |

M. Toutes les six heures une cuillerée à dessert.

49. **POTION** antiscrofuleuse de Hufeland et Crawford.

| | |
|---|---|
| Chlorure de baryum, — de fer, | āā 2 grammes. |
| Eau de cannelle, Sirop d'éc. d'orange, | āā 30 — |

Mêlez.

Vingt à trente gouttes toutes les trois heures.

50. **POTION** contre l'angine tonsillaire aiguë.

(*Formule du docteur Moris.*)

| | |
|---|---|
| Gaïac en poudre, | 15 grammes. |
| Mucilage et sirop, p. ég., | 30 — |
| Eau de casse, | 15 — |
| Eau, | 180 — |

Mêlez, et prenez-en une dose de 31 grammes trois fois par jour.

51. **POTION** antiasthmatique.

| | |
|---|---|
| Racine d'aunée, | 30 grammes. |
| — d'iris, | 15 — |

F. infuser dans Q. S. d'eau pour obtenir 300 grammes de colature.

Ajoutez :

| | |
|---|---|
| Gomme ammoniaque dissoute dans Q. S. de vinaigre scillitique, | 12 grammes. |
| Sirop de polygala de Virginie, | 30 — |

Quatre à six cuillerées par jour dans la dyspnée polyblennique.

52. **POTION** balsamique du docteur Thiry contre les écoulements.

| | |
|---|---|
| Baume copahu, | 31 grammes. |
| Poudre de poivre cubèbe, | 31 — |
| Poudre de quinquina, | 12 — |
| Cachou, | 12 — |
| Sous-carbonate de fer, | 8 — |

F. S. A.

53. **POTION** de castoreum composée contre les spasmes, les coliques nerveuses, les coliques menstruelles, l'hystérie, les névralgies en général.

(*Formule de M. Lebrou.*)

| | |
|---|---|
| Eau distillée de valériane, | 1,000 grammes. |
| Eau distillée de laurier-cerise, | 500 — |
| Sucre blanc, | 8,000 — |
| Castoreum, | 62 — |
| Alcool à 30°, | Q. S. |

On fait macérer le castoreum dans l'alcool huit jours. On filtre et on chauffe. (*Restaurador pharmaceut.*)

54. **POTION** employée dans le délirium trémens des blessés.

(*Formule de M. le docteur Jobert.*)

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 128 grammes. |
| Alcali volatil, | 4 gouttes. |
| Sirop de sucre, | 32 grammes. |

Cette potion est donnée par cuillerée de deux heures en deux heures aux malades qui ont reçu des blessures étant dans l'état d'ivresse, ou chez lesquels l'habitude de l'ivrognerie, jointe à une

Digitized by Google

exaltation, fait redouter l'invasion du délirium trémens.

55. **POTION** employée à la suite d'un accouchement laborieux.

(*Formule du docteur Vanoye.*)

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 250 grammes. |
| Ammoniaque, | 99 gouttes. |
| Sirop de menthe, | 30 grammes. |

A prendre par cuillerées toutes les demi-heures.

56. **POTION** employée contre le délire alcoolique.

(*Formule de M. Vidart.*)

| | |
|---|---|
| Tartre stibié, | 80 centigr. |
| Laudanum, | 10 gouttes. |
| Eau, | 250 grammes. |

A prendre par cuillerées toutes les heures.

57. **POTION** employée dans la fièvre typhoïde.

| | |
|---|---|
| Forte infusion de racine de valériane, | 125 grammes. |
| Sulfate de quinine, | 60 centigr. |
| Laudanum de Sydenham, | 20 à 30 gout. |
| Sirop de fleurs d'oranger, | 30 grammes. |

F. S. A.

On prend cette potion par cuillerées à bouche toutes les deux ou trois heures.

58. **POTION** contre les névralgies.

(*Formule du docteur Hogg, de Finsburg.*)

| | |
|---|---|
| Sulfate de quinine, | 50 centigr. |
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Acide sulfurique, | 10 gouttes. |

F. S. A.

Cette potion se prend une fois toutes les six heures.

59. **POTION** employée contre le rhumatisme aigu.

(*Formule de M. Worms.*)

| | |
|---|---|
| Infusion de fleurs de sureau, | 320 grammes. |
| Nitrate de potasse, | 12 — |
| Tartre stibiée, | 10 centigr. |
| Miel épuré, | Q. S. pour édulcorer. |

On donne deux cuillerées par heure de cette potion. On diminuera peu à peu la dose.

60. **POTION** avec le sulfate de quinine contre les névralgies.

(*Formule de M. Hogg, de Fiusburg.*)

| | |
|---|---|
| Sulfate de quinine, | 50 centigr. |
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Acide sulfurique, | 10 gouttes. |

F. S. A., à prendre en une seule fois.

M. Hogg dit qu'à la suite de l'administration de cette dose de sulfate de quinine, il peut survenir de l'excitation de l'ouïe et de la vue avec de légers vertiges.

M. le docteur Piorry a souvent donné le sulfate de quinine, contre les fièvres intermittentes, à la dose de 50 à 75 centigrammes, et de 1 gramme à 1 gramme 25 centigrammes contre les fièvres intermittentes et contre les typhoïdes. Quelquefois on a observé chez les malades du bourdonnement dans les oreilles, mais sans autres accidents.

61. **POTION** du docteur Schneider contre la sciatique.

| | | |
|---|---|---|
| Essence de térébenthine, / Poudre de gomme arabique, | āā | 2 grammes. |
| Eau de menthe crépue, | 125 | — |
| Sucre, | 15 | — |
| Sirop de menthe poivrée, | 30 | — |

Deux cuillerées à soupe trois fois par jour.

Le docteur Schneider, d'Offenbourg, emploie avec succès cette potion dans les cas de sciatique et de coxalgie invétérée. Il fait pratiquer en même temps, plusieurs fois par jour, des frictions sur les parties endolories au moyen d'un liniment composé de :

| | |
|---|---|
| Essence de térébenthine, | 1 gramme. |
| Liniment vol. camphré, | 2 — |

62. **POUDRE** contre la coqueluche.

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, / Acide benzoïque, | āā | 4 centigr. |
| Poudre de gomme arab., | 10 grammes. | |

Mêlez et divisez en douze prises. En prendre une toutes les deux heures dans de l'eau.

63. **POUDRE** du docteur Thiry contre les écoulements.

| | |
|---|---|
| Poudre de cubèbe, | 68 grammes. |
| Poudre de sulfate d'alumine, | 16 — |

Digitized by Google

Mélez et divisez en neuf parties égales. On en prend trois par jour.

64. **POUDRE** de phosphate de chaux contre les affections scrofuleuses.

(*Formule de M. le docteur Beneke.*)

| | |
|---|---|
| Phosphate de chaux, | 1 gramme. |
| Sucre, | 2 — |

F. S. A. en 10 paquets.

On en donne de deux à cinq par jour aux enfants de six à dix ans.

65. **PRÉPARATIONS** de caféine.

(*Formule de M. Ed. Van den Corput.*)

CITRATE DE CAFÉINE.

| | |
|---|---|
| Sucre pulvérisé, | 31 grammes. |
| Citrate de caféine, | 16 — |

On divise les cristaux asbestiformes de citrate de caféine à l'aide du sucre, et l'on partage le mélange en doses de 7 décigrammes 5 centigrammes.

1° On prépare ce sel en ajoutant à la caféine pure une solution d'acide citrique et l'abandonnant à une température de 40° centigrades ou 32° Réaumur. Ce sel cristallise en longues aiguilles satinées, d'une blancheur éclatante, groupées concentriquement autour de points centraux.

2° On l'obtient aussi en traitant la caféine pulvérisée par une solution faible d'acide citrique, en agitant la liqueur avec un volume égal d'éther, décantant et laissant cristalliser, après concentration, la solution aqueuse.

CITRATE DE FER ET DE CAFÉINE.

On le prépare par la combinaison de 1 gramme de citrate de caféine avec 4 grammes de citrate de fer. Le produit se présente en écailles cristallisées rayonnées, de couleur rouge jaunâtre. Il est assez soluble dans l'eau.

LACTATE DE CAFÉINE.

Ce composé s'obtient par combinaison directe, en évaporant à une chaleur douce; il cristallise difficilement et forme le plus souvent une masse amorphe ou confusément cristalline.

On peut l'obtenir encore en traitant à chaud l'infusion de café vert par le lactate calcique, filtrant et évaporant les liqueurs.

TABLETTES DE LACTATE DE CAFÉINE.

| | |
|---|---|
| Sucre pulvérisé. | 62 grammes. |
| Lactate de caféine, | 1 gr. 6 décigr. |
| Caféine (huile essentielle de café torrifié), | 1 goutte. |
| Mucilage de gomme adragante, | Q. S. |

MALATE DE CAFÉINE.

Ce sel peut se préparer d'une manière analogue au précédent; il cristallise en étoiles à rayons aciculaires : il est très-soluble.

SIROP DE MALATE DE CAFÉINE.

| | |
|---|---|
| Malate de caféine, | 4 grammes. |
| Eau de fleur d'oranger, | 31 — |
| Saccharole simple, | 250 — |

Dissolvez le malate dans l'eau de fleurs d'oranger ou dans une quantité suffisante d'eau distillée, puis ajoutez le sirop.

SOLUTION CHLORHYDRIQUE DE CAFÉINE.

| | |
|---|---|
| Caféine, | 35 centigr. |
| Eau distillée, | 93 grammes. |
| Acide chloridrique pur, | 2 gouttes. |
| Saccharole de fleurs d'oranger, | 16 grammes. |

F. S. A. par cuillerées à soupe.

Hemicranie.— Fièvres intermittentes.

COLLYRE DE CAFÉINE.

| | |
|---|---|
| Caféine pure, | 1 gramme. |
| Eau distillée, | 100 — |

Il faut dissoudre la caféine à l'eau distillée bouillante. — On laisse refroidir. — En fomentation comme colyre, on peut l'étendre d'une quantité double ou triple d'eau.

66. **PRÉPARATIONS** au citrate de fer et de magnésie.

(*Formules de M. Van den Corput.*)

CITRATE DE FER ET DE MAGNÉSIE.

On le prépare en dissolvant d'abord, 2 atômes d'oxyde ferrique hydraté récemment précipité dans un soluté de 3 atômes d'acide citrique, saturant ensuite la liqueur par du carbonate magnésique, puis évaporant à siccité. Ce sel se présente en écailles brunes, brillantes, d'une saveur douceâtre, très-faiblement atramentaire, qui n'a rien de désagréable. Il est parfaitement soluble dans l'eau et a sur le ferro-citrate d'ammoniaque l'avantage de n'être point déliquescent, ce qui permet de l'administrer sous forme de poudre. De plus, il ne produit pas la constipation, que détermine l'usage de la plupart des autres ferrugineux.

Dose : 15, 30 à 60 centigrammes.

Digitized by Google

SIROP DE CITRATE DE FER ET DE MAGNÉSIE.

| | |
|---|---|
| Citrate de fer et de magnésie, | 8 grammes. |
| Dissolvez dans : | |
| Eau de fleur d'oranger, | 15 — |
| Sirop simple, | 120 — |

Ce sirop est l'une des préparations ferrugineuses les plus agréables.

SACCHARURE DE CITRATE DE FER ET DE MAGNÉSIE.

| | |
|---|---|
| Citrate de fer et de magnésie, | 4 grammes. |
| Sucre en poudre, | 30 — |
| Poudre de cannelle, | 4 — |

Mêlez et divisez en doses de 75 centigrammes.

PASTILLES DE CITRATE DE FER ET DE MAGNÉSIE.

| | |
|---|---|
| Citrate de fer et de magnésie, | 2 gr. 4 centigr. |
| Sucre en poudre, | 30 grammes. |
| Saccharure de vanille, | 2 — |
| Mucillage de gomme adraganthe, | Q. S. |

Faites S. A. des tablettes de 75 centigrammes.

## 67. PRÉPARATION contre la carie des dents.

(*Formule de M. Stokes.*)

M. Stokes, pour limiter la carie des dents avant de procéder à l'opération du plombage, introduit dans la cavité de la dent malade un mélange d'un vingtième de grain d'acide arsénieux et d'un dixième d'hydrochlorate de morphine. Il recouvre ce mélange d'une petite boulette de coton imprégnée de créosote, qu'il enfonce jusqu'à ce qu'elle ait atteint la partie sensible de la dent, le tout est ensuite maintenu à l'aide d'un peu de cire ramollie. Vingt-quatre heures après cette application, il est facile d'enlever la pulpe dentaire cariée. Toutefois, si ce *curage* était trop douloureux, on le suspendrait, et l'on reviendrait à l'introduction du mélange de morphine, d'arsenic et de coton imbibé de créosote. Le tamponnement se fait en dernier lieu avec de l'or et du plomb, d'après les procédés ordinaires. (*Medical-Times.*)

## 68. PRÉPARATION de l'eau d'Enghien artificielle.

(*Formule de M. E. Barruel.*)

Pour douze bouteilles (620 grammes) :

| | |
|---|---|
| Eau commune filtrée et récemment bouillie, | 6 litres ½ |
| Eau chargée d'acide carbonique à 5 volumes, | 2 — |
| Eau saturée, à la température ordin., d'acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré), | 1 — |
| Eau pour dissoudre les sels, | 0 — ½ |

On fait avec 250 grammes d'eau prise sur celle qui doit dissoudre les sels, une solution n 1°, avec :

| | |
|---|---|
| Chlorure de sodium, | 20 grammes. |
| Chlorure de magnésium cristallisé, | 1 — |
| Chlorure de calcium cristallisé, | 20 — |
| Sulfure de calcium porphyrisé, | 1 — |

On fait avec 250 grammes d'eau une dissolution n° 2, avec :

| | |
|---|---|
| Bicarbonate de soude, | 10 grammes. |
| Sulfate de soude cristallisé, | 6 — |

## 69. PRÉPARATIONS faites avec le soufre brun contre les affections dartreuses.

(*Formule de M. le docteur Hannon.*)

| | |
|---|---|
| Soufre brun précipité, | Q. S. |
| Cérat simple, | 8 grammes. |
| Baume de Tolu, | 1 scrupule. |

Mêlez.

POMMADE AU SOUFRE BRUN PRÉCIPITÉ.

| | |
|---|---|
| Soufre brun précipité, | 8 grammes. |
| Baume de Tolu, | Q. S. |
| Axonge, | 28 grammes. |

Mêlez.

ONGUENT AU SOUFRE BRUN PRÉCIPITÉ.

| | |
|---|---|
| Soufre brun précipité, | 4 grammes. |
| Baume de Tolu, | 1 scrupule. |
| Axonge, | 28 grammes. |

Mêlez.

## 70. PRÉPARATION médicamenteuse de l'eau de mer.

(*Mode de MM. Leriche et Pasquier.*)

L'eau de mer prise au bord du rivage contient des matières animales et végétales facilement putrescibles, qui lui donnent une saveur désagréable, et qui empêchent les personnes à qui cette eau est ordonnée d'en continuer l'emploi.

Les auteurs du mode en question ont eu l'idée de la rendre gazeuse en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'elle fût pure. On la fit puiser à 8 kilomètres de distance du rivage et à quel-

Digitized by Google

ques mètres de profondeur, puis filtrer, et charger d'acide carbonique à 4 volumes.

Les malades qui avaient essayé de prendre l'eau de mer ordinaire, trouvèrent que la préparation ci-dessus indiquée la rendait plus légère, moins désagréable. Cette eau ainsi préparée agit comme purgatif, prise à la dose de trois à quatre verres.

De plus, l'addition de l'acide carbonique permet de la conserver indéfiniment, tandis que sans ce gaz elle deviendrait bientôt putride.

(*Brevet d'invention de cinq ans*, 1842.)

71. **PRÉPARATION** spéciale contre les infiltrations séreuses.

(*Formule de M. le docteur Cruveilhier.*)

| | |
|---|---|
| **Macération de feuilles de digitale,** | 1 gramme. |
| Dans eau, | 250 — |
| Ether nitrique, | 2 — |
| Sirop des cinq racines, | 30 — |

Ce médicament a très bien réussi sur un malade ayant une affection organique du cœur, et dont le tissu cellulaire, surtout dans les membres inférieurs, était le siége d'une infiltration considérable.

72. **PRÉPARATIONS** au sulfure de carbone, contre la goutte.

(*Formule de Wulger, de Bonn.*)

*En potion*, pour cuillerées, toutes les deux heures :

| | |
|---|---|
| Sulfure de carbonne, | 4 grammes. |
| Alcool rectifié, | 15 — |

(*Formule de M. Turnbull.*)

*En liniment :*

| | |
|---|---|
| Sulfure de carbonne, | 8 grammes. |
| Camphre, | 30 centigr. |
| Alcoolat de Fioventi, | 90 grammes. |
| Baume du Pérou, | 4 — |

Frictions matin et soir.

73. **SAVONULE** d'huile de foie de morue.

(*Formule de M. Delahaye.*)

| | |
|---|---|
| Carbonate de magnésie, | 10 grammes. |
| Huile de foie de morue brune, | 50 — |

(*Formule de M. Debout.*)

| | |
|---|---|
| Huile de foie de morue, | 2 parties. |
| Lessive des savonniers, | 1 — |

74. **SIROP** d'iodure d'amidon.

(*Formule de M. Magnes-Lahens.*)

| | |
|---|---|
| Iodure d'amidon soluble, | 25 grammes. |
| Eau, | 332 — |
| Sucre, | 666 — |

On introduit d'abord l'iodure et l'eau dans un matras chauffé au bain-marie. La solution d'iodure d'amidon soluble bien opérée, on ajoute le sucre, et on met ce sirop ainsi préparé dans un flacon hermétiquement bouché.

75. **SIROP** sédatif pour faciliter la dentition des enfants et les préserver des convulsions.

| | |
|---|---|
| Safran, | 10 grammes. |
| Vin blanc généreux, | 250 — |
| Miel blanc, | 550 — |

On incise le safran, on fait macérer six jours, on passe avec expression, on filtre la liqueur, on y ajoute le miel.

On emploie ce mellite en frictions sur les gencives, cinq ou six fois par jour.

76. **SOLUTION** d'aconit contre les accès de goutte.

(*Formule du docteur Pritterich.*)

| | |
|---|---|
| Alcoolature d'aconit, | 1 gramme. |
| Eau distillée, | 30 — |

77. **TANNIN** employé dans les affections oculaires.

(*Formule de M. Haision.*)

| | |
|---|---|
| Tannin, | 1 partie. |
| Eau distillée, | 3 — |

78. **TEINTURE** concentrée de gingembre contre la myopie.

(*Formule de M. Turnbull.*)

| | |
|---|---|
| Gingembre en poudre, | 1 partie. |
| Esprit de vin décoloré par le charbon animal, | 2 parties. |

Laissez en contact pendant 4 jours; passez et filtrez. Cette teinture est employée en frictions sur tout le front, afin d'agir sur les nerfs de la 5e paire.

M. Turnbull a aussi employé pour ces frictions l'*extrait de gingembre* et la *teinture de poivre*, préparée dans les mêmes proportions que celle de gingembre.

Digitized by Google

79. **TISANE** employée contre l'asthme.

(*Formule de M. le docteur Debreyme.*)

| | |
|---|---|
| Camphrée de Montpellier, | 30 à 50 grammes. |
| Eau, | 500 grammes. |

On en prend plusieurs tasses par jour.

80. **TOPIQUE** contre les arthrites, les hydartroses et les tumeurs blanches.

(*Formule de M. Miggues.*)

| | | |
|---|---|---|
| Teinture de digitale camphrée, | | 180 grammes. |
| Chlorate de soude, Chlorure de sodium, | ää | 2 — |

81. **TOPIQUE** contre la colique de plomb.

(*Formule de M. le docteur Aran.*)

| | |
|---|---|
| Chloroforme, | 40 gouttes. |
| Gomme adragante, | 4 grammes. |
| Sirop de sucre, | 30 — |
| Eau, | 100 — |

A prendre par cuillerée.

82. **VINAIGRE** cosmétique et sanitaire.

(*Formule de M. Cottam et comp.*)

| | | |
|---|---|---|
| Alcool à 32 degrés, | 100 | litres. |
| Eau spiritueuse de mélisse, | 15 | — |
| Esprit de lavande, | 10 | — |
| — de romarin, | 10 | — |
| Essence de bergamotte, | 1000 | grammes. |
| — de bigarade, | 600 | — |
| — de citron, | 400 | — |
| — d'orange, | 350 | — |
| — de néroli, | 200 | — |
| — de menthe, | 150 | — |
| — de thym, | 150 | — |
| — de girofle, | 50 | — |
| — de cannelle, | 25 | — |
| — de verveine, | 150 | — |

On mêle le tout ensemble, et on distille au bain-marie, de manière à obtenir 126 litres; on met en infusion pendant un mois dans le tiers de ces 126 litres, 15 kilogrammes d'iris de Florence concassée et 2 kilogrammes de baume de Tolu; on filtre, on réunit au reste du produit distillé, et on ajoute 15 litres d'acide acétique à 8 degrés; au bout de vingt-quatre heures, on filtre le tout. (*Brevet d'invention de cinq ans*, 1842.)

83. **VOMITIF** et mixtures employés contre le croup laryngé.

(*Formule du docteur Trousseau.*)

Potion à prendre par cuillerées à café toutes les dix minutes :

| | |
|---|---|
| Sulfate de cuivre, | 25 centigr. |
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Sirop simple, | 32 — |
| Mixtures : | |
| 1° Calomel, | 50 centigr. |
| Miel, | 40 grammes. |
| 2° Alun, | 10 — |
| Miel, | 40 — |

A prendre alternativement toutes les demi-heures.

84. **MIXTURE** employée contre les ulcères atoniques de la jambe.

(*Formule du docteur Hancock*).

| | |
|---|---|
| Essence de térébenthine, | 24 grammes. |
| Poudre d'accacia, | 24 — |
| Eau de menthe poivrée, | Q. S. |

Pour une mixture de 250 grammes. On en prend 30 grammes trois fois par jour.

85. **FRICTIONS** employées contre la myopie.

(*Formule du docteur Turnball.*)

| | |
|---|---|
| Gingembre, | 1 partie. |
| Esprit-de-vin décoloré par le charbon animal, | 2 parties. |

86. **PRÉPARATIONS** de jusée.

On a donné le nom de *jusée* à la liqueur de tan dans laquelle on fait macérer les peaux pour opérer le tannage.

M. Ernest Barruel vient de faire connaître à l'Académie de médecine qu'on peut préparer avec la jusée des médicaments à l'aide desquels on peut soulager les phthisiques.

D'après ce pharmacien, la jusée peut être donnée en extrait, en pilules, en sirop, soit seule, soit additionnée d'eaux distillées d'amandes et de valériane.

M. Barruel dit que ce médicament arrête les sueurs chez les phthisiques.

Digitized by Google

87. **ALCOOLATURE** d'aconit contre la goutte inflammatoire.

| | |
|---|---|
| Alcoolature d'aconit, | 1 gramme. |
| Eau distillée, | 30 |

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

88. **ALCOOLÉ** de chlorhydrate de fer dans l'érysipèle;

*Par MM. Hamilton et Charles Bell.*

| | |
|---|---|
| Oxyde rouge de fer, | 1 gramme. |
| Acide chlorhydrique, | 4 — |
| Alcool, | 6 — |

Quinze à vingt gouttes toutes les deux heures.

89. **AMIDON**; son emploi dans divers cas de maladies de la peau;

*Par M. Cazenave.*

L'amidon est une substance blanche, inodore, insipide, très employée en médecine comme analeptique, émolliente; M. Cazenave s'en sert comme topique dans un grand nombre d'eruptions aiguës, dans l'eczéma, le lichen, l'herpes, l'impétigo, l'acné.

A titre négatif, l'amidon peut être employé pour remplacer les lotions et les pommades qui, très souvent, sont mal tolerées.

Dans un grand nombre de cas, il remplace avantageusement les cataplasmes de fœcule de pommes de terre, qui ne peuvent pas être longtemps employés et après lesquels il peut y avoir de l'inconvenient à laisser la peau exposée, sans rien qui la garantisse, au contact de l'air.

Enfin, c'est, suivant M. Cazenave, un moyen efficace pour calmer les démangeaisons. Dans le cas de prurit des bourses, de l'anus, des aines, soit sans lotion préalable, soit après avoir lavé avec une solution alcaline ou autre et après avoir exactement essuyé, il est très utile de saupoudrer les parties malades avec une houppe imprégnée d'amidon sec.

Ce praticien se sert le plus souvent d'amidon pulverulent pur; mais dans quelques circonstances, il l'a associé avec avantage avec l'oxyde blanc de zinc, le camphre, etc.

*Mélange pulvérulent.*

| | |
|---|---|
| Oxyde blanc de zinc, | 8 grammes. |
| Poudre d'amidon, | 125 — |

Mêlez.

Pour saupoudrer matin et soir les surfaces atteintes d'eczéma aigu, d'acné rosacea, d'impétigo, d'herpès.

*Autre.*

| | |
|---|---|
| Oxyde blanc de zinc, | 8 grammes. |
| Camphre, | 2 — |
| Poudre d'amidon, | 125 — |

Mêlez.

Pour saupoudrer les aines, les aisselles, les parties génitales dans le cas de prurigo.

(*Ann. des maladies de la peau et de la syphilis.*)

90. **ANTIDOTES** de la strychnine.

Tannin, 60 centigr. dans de l'eau distillée et du sirop simple.

On donne ensuite une décoction d'écorce de chêne, 60 grammes.

| | |
|---|---|
| Colature, | 180 — |
| Sirop de cannelle, | 30 — |
| Ether sulfurique, | 1 — |

91. **ARSENIC** employé comme fébrifuge;

*Par M. Boudin.*

| | |
|---|---|
| Vin, | 35 grammes. |
| Eau de cannelle, | 35 — |
| Solution arsénicale, | 10, 20, 30, 60 — |

Cette solution est faite avec :

| | |
|---|---|
| Eau, | 100 grammes. |
| Oxyde blanc d'arsenic, | 1 décigr. |

On débute par 5 centigrammes d'oxyde blanc d'arsenic en une seule fois.

92. **BAINS** contre les rhumatismes chroniques;

*Par M. Smith.*

| | |
|---|---|
| Carbonate de soude, | 1 kilogr. |
| Essence de térébenthine, | 200 grammes. |
| Essence de romarin, | 10 — |

Chez les femmes à peau délicate et chez les enfants, on reduit la dose de térébenthine à 50 grammes. On reste dans le bain de dix à quinze minutes. On commence le traitement par 500 grammes de carbonate de soude, 150 de térébenthine. On repète ces bains tous les deux ou trois jours.

93. **BOLS** de copahu et de cubèbe contre l'hématurie;

*Par le docteur Avella.*

| | |
|---|---|
| Copahu, | 50 centigr. |
| Cubèbe, | 30 — |

Faire prendre deux bols semblables par jour.



Digitized by Google

94. **CAUTÉRISATION** des fosses nasales dans les ophtalmies chroniques ;

*Par M. Tavignot.*

| | |
|---|---|
| Poudre d'iris, | 30 grammes. |
| Nitrate d'argent pulvérisé, | 1 — |
| Camphre, | 2 — |

Une, puis deux prises par jour.

*Autre.*

| | |
|---|---|
| Poudre d'iris, | 30 grammes. |
| Sulfate de zinc, | 2 — |
| Camphre, | 1 — |

On peut augmenter la quantité du sulfate de zinc en substituer le sulfate de cuivre. Il faut en continuer l'usage jusqu'à ce qu'on ait obtenu une sorte d'inflammation erythemateuse de la muqueuse nasale.

95. **COLIQUE** de plomb; son traitement.

(*Formule de M. Bretonneau.*)

*Poudre.*

| | |
|---|---|
| Extrait de belladone, | 5 centigr. |
| Poudre de racine de belladone, | 10 — |

Le second jour, 10 centigrammes de l'un pour 20 centigr. de l'autre.

Le troisième jour, 15 centigr. pour 30 centigr.

Le quatrième jour, 20 centigr. pour 20 centigr.

Donnez des quarts de lavements contenant :

Extrait de belladone, 2 à 3 centigr.

Faites des frictions sur l'abdomen avec :

| | |
|---|---|
| Axonge, | 10 grammes. |
| Extrait de belladone, | 5 — |

96. **COLLYRE** pour provoquer rapidement la rétraction de l'iris, à la suite des plaies ou des ulcérations de la cornée

(*Formule de M. Morehouse.*)

| | |
|---|---|
| Sulfate d'atropine, | 25 centigr. |
| Eau distillée, | 30 grammes. |

On fait des applications de ce collyre avec un petit pinceau.

97. **COLLYRES** avec le nitrate d'argent, la teinture de cantharides, la teinture d'iode, le sublimé corrosif.

(*Formules de M. Tavignot.*)

COLLYRE AU NITRATE D'ARGENT.

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Nitrate d'argent, | 3 — |

On obtient ainsi un collyre très actif, dont on fait usage de la manière suivante : trois à quatres gouttes seulement sont instillées dans l'œil malade ; cinq à six heures après cette première instillation, s'il n'est pas survenu une reaction jugée suffisante, on a recours à une seconde ; une troisième peut même être indiquée dans quelques circonstances.

M. Tavignot a prescrit ce collyre dans des cas de keratite plastique onctuée et de kératite vasculaire superficielle, toutes deux passées à l'état chronique ; il a remarqué que l'action du collyre était assez energique pour le but que l'on se propose. Il ajoute, néanmoins, que l'on peut encore, et sans inconvénient, augmenter la dose de l'agent substituteur dans des cas plus graves et devenus rebelles. C'est ainsi que la dose du nitrate d'argent peut être portée à 6 grammes pour 30 grammes d'eau distillée, dans le pannus ; par exemple :

COLLYRE AVEC LES CANTHARIDES.

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Teinture de cantharides, | 2 — |
| Gomme, | Q. S. |

Pour tenir en suspension.

L'action de ce collyre est réellement énergique. On l'emploie comme le précédent ; mais on n'y a recours que dans les cas reellement désespérés, tels que ceux que l'on combattait naguère par l'inoculation du pus provenant de l'ophthalmie contagieuse.

COLLYRE AVEC L'IODE.

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Teinture d'iode, | 6 — |
| Iodure de potassium, | 4 — |

Ce collyre détermine une réaction phlegmasique moins intense que les précédents, et néanmoins son action résolutive a paru, dans plusieurs cas, d'une energie extrême. M. Tavignot l'a employé pour combattre les lésions multiples de la cornée caractérisées par des epanchements plastiques disséminés dans cette membrane, des vaisseaux nombreux à sa surface, un ramollissement de son tissu. Mais, pour agir efficacement, ce collyre doit être recemment préparé ; après vingt-quatre ou trente-six heures, l'iode a changé d'état, et le médicament n'agit plus. Plusieurs fois il a instille quelques gouttes de teinture d'iode pure dans des yeux atteints de pannus granuleux.

Digitized by Google

COLLYRE AU SUBLIMÉ.

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 30 grammes. |
| Sublimé corrosif, | 20 centigr. |

On obtient ainsi un collyre assez énergique dans son action sur l'œil, sans qu'il en résulte une réaction trop vive.

### 98. CRÉOSOTE dans le traitement interne du charbon;

*Par M. Eutenberg.*

| | |
|---|---|
| Créosote, | 1 goutte. |
| Esprit de vin rectifié, | 10 — |
| Décotion de guimauve, | 180 grammes. |

Une cuillerée toutes les heures; on panse les incisions avec un mélange de créosote, d'essence de térébenthine, d'alcool camphrée.

### 99. DÉCOCTION de buis contre l'arthrite chronique.

(*Formule de M. Cazin.*)

| | |
|---|---|
| Rapures de racines de buis, | 30 grammes. |
| Eau, | 1 kilogr. |

Faites bouillir jusqu'à réduction de 500 grammes.

A prendre les 500 grammes en trois doses dans les vingt-quatre heures.

### 100. DÉCOCTION et POUDRE hémostatique de matico;

*Par M. Cazendre.*

On lave la blessure et on en arrose les bords rapprochés avec une infusion froide, ou mieux une décoction:

| | |
|---|---|
| Feuilles de matico, | 30 à 40 grammes. |
| Eau, | 1 litre. |

Et on place par dessus une couche de feuilles ou de poudre de feuilles.

*Pour l'usage interne*: infusion à froid.

| | |
|---|---|
| Feuilles de matico, | 4 à 8 grammes. |
| Eau, | 1 litre. |

Prendre un quart de verre quatre à huit fois par jour, ou à la même dose de la décoction suivante:

| | |
|---|---|
| Feuilles de matico, | 3 à 5 grammes. |
| Eau, | 1 litre. |

### 101. DÉCOCTION de polygala senega dans l'amenorrhée;

*Par M. Chapman.*

| | |
|---|---|
| Eau bouillante, | 1 litre. |
| Polygala senega, | 30 grammes. |

Faire bouillir jusqu'à réduction d'un tiers et ajouter une substance amère aromatique pour détruire les effets nauséeux de cette boisson.

On administre à la dose de 120 grammes dans les vingt-quatre heures tous les jours à l'approche des époques menstruelles.

### 102. DÉCOCTION de racines de bardane contre les accidents tertiaires de la syphilis;

*Par le docteur Cazin.*

| | |
|---|---|
| Racines de bardane en morceaux, | 240 grammes. |
| Vin blanc et eau de fontaine, | 1,000 |

Faire bouillir jusqu'à réduction de moitié et ajouter à la fois:

| | |
|---|---|
| Follicules de séné, | 30 grammes. |

Prendre 250 grammes chaque matin.

### 103. EAU artificielle de Vichy.

| | |
|---|---|
| Bicarbonate de soude, | 5 grammes. |
| Chlorure de sodium, | 20 centigr. |
| Sulfate de soude, | 50 — |
| Sulfate de magnésie, | 15 — |
| Sulfate de fer, | 1 — |

Pour une bouteille d'eau, ajoutez 3 grammes d'acide citrique pour la rendre gazeuse.

### 104. EAU de goudron de M. Cazenave.

| | |
|---|---|
| Goudron, | 200 grammes. |
| Eau commune, | 1,000 — |

Faites macérer l'eau sur le goudron.

### 105. EAU distillée de roses;

*Par M. Leguay.*

| | |
|---|---|
| Pétales de roses pâles, | 8 kilogr. |
| Chlorure de sodium, | 400 grammes. |
| Eau commune, | 12 litres. |

Pilez les fleurs de roses avec le sel, placez-les sur un diaphragme et distillez à un feu modéré jusqu'à ce que vous ayez obtenu 8 litres d'eau distillée. Le pilage a pour but d'obtenir toute l'huile volatile contenue dans les pétales, et d'en diminuer le volume. L'addition du chlorure de sodium produit une élévation de température.

Selon M. Leguay, l'eau de roses obtenue par ce procédé, est aussi aromatique à la fin de l'opération qu'au commencement.

Digitized by Google

**106. EAU** purgative gazeuse au tartrate de soude;

*Par M. Viel.*

Cette eau jouit de propriétés purgatives aussi puissantes que celles de l'eau de Sedlitz, ayant surtout l'avantage d'être prise sans repugnance, et de ne pas exciter les vomissements chez les personnes délicates.

Voici sa formule :

| | | |
|---|---|---|
| Tartrate de soude. 32, 48 ou 60 | grammes. | |
| Bicarbonate de soude, | 2 | — |
| Acide citrique, | 4 | — |
| Eau, | 300 | — |

Faites d'abord dissoudre le tartrate et le bicarbonate de soude dans la quantité d'eau prescrite, filtrez, puis ajoutez l'acide, bouchez et ficelez.

Cette eau se conserve très bien, elle est d'un prix de revient à peu près egal à celui de l'eau de Sedlitz.

**107. ÉLIXIR** de Garus.

(*Formule adoptée par la Société de pharmacie d'Anvers.*)

| | | |
|---|---|---|
| Aloès succotrin, | 31 | grammes. |
| Safran, | 31 | — |
| Myrrhe, | 31 | — |
| Cannelle, | 31 | — |
| Girofle, | 31 | — |
| Noix muscades, | 16 | — 50 |
| Alcool à 21° Cartier, | 8 | kilogr. |
| Eau de fleur d'oranger, | 500 | grammes. |

Faire macérer pendant deux jours et distiller au bain-marie pour obtenir la liqueur alcoolique.

Ajouter : Sirop de capillaire.

Colorer le mélange avec Q. S. de safran (16 gr.) que l'on fait macérer dans l'eau de fleurs d'oranger.

**108. ÉLIXIR** odontalgique.

(*Formule de M. Violand.*)

| | | |
|---|---|---|
| Teinture de Pyrèthre, | 2 | parties. |
| Ether camphré, | 2 | — |
| Laudanum de Sydenham, | 1 | — |

Mêlez.

Quelques gouttes sur du coton qu'on place sur la dent.

**109. EMPLATRE** d'euphorbe.

(*Formule de M. Hainaut.*)

| | | |
|---|---|---|
| Axonge, | 155 | grammes. |
| Cire jaune, | 93 | — |
| Poudre d'euphorbe, | 250 | — |

Faites digérer la résine et l'axonge pendant deux heures, ajoutez la cire, et remuez jusqu'à refroidissement.

**110. EMPLOI** avantageux du pain de son contre la constipation.

Le pain de son, employé comme nourriture habituelle, a été avantageusement employé par M. Goupil pour guérir une jeune fille d'une constipation persistante. Ce pain agit en désagrégeant, et non en rendant plus fluides les matières fécales; les particules du son s'interposent entre les matières de la digestion, les rendent pulvérulentes et en facilitent l'expulsion. Cet emploi est donc utile à connaître, et il est bon de rappeler qu'à Paris, l'ervaleuta, ou farine de lentilles, a été employée dans le même but Cette farine a été faite avec tous les résidus de lentilles avariées, ce qui tend à faire subordonner son emploi à celui d'un produit d'une origine plus convenable.

**111. EMPLOI** externe de l'ipécacuanha, dit *liniment de Hannay.*

| | | |
|---|---|---|
| Poudre d'ipécacuanha, | 1 | partie. |
| Huile d'olives, | 1 | — |
| Axonge, | 2 | — |

**112. EMPLOI** de l'oxyde d'argent;

*Par M. Throcat.*

| | | |
|---|---|---|
| Oxyde d'argent, | 60 | centigr. |
| Opium en poudre, | 5 | — |

F. S. A. 12 pilules; une matin et soir.

*Autre.*

| | | |
|---|---|---|
| Oxyde d'argent, | 50 | centigr. |
| Acétate de morphine, | 5 | — |

F. S. A. 20 pilules; une matin et soir.

Pour la préparation de l'oxyde d'argent, on decompose un sel soluble d'argent, le nitrate, par exemple, par un soluté de soude ou de potasse caustique, on lave à plusieurs eaux le precipité noir produit, c'est l'oxyde d'argent. Cet oxyde, étant peu stable, on le conserve dans un flacon bouché avec soin.

**113. EMPLOI** des opiacés contre la fièvre typhoïde.

(*Formule de Bena Jones.*)

| | | |
|---|---|---|
| Camphre, | 10 | centigr. |
| Opium, | 2 1/2 | — |

Une pilule toutes les demi-heures.

On peut porter jusqu'à 5 centigr. la dose de l'opium.

Digitized by Google

114. **EMPLOI** du seigle ergoté contre la paraphlégie;

*Par M. Gerard.*

| | |
|---|---|
| Seigle ergoté, | 50 centigrammes. |

Progressivement élever la dose à 2,50 grammes.

115. **EMPLOI** du sumbul contre l'hystéro-épilepsie;

*Par M. Pettigren*

| | |
|---|---|
| Teinture de sumbul, | 10 gouttes. |
| Eau, | Q. S. |

Prendre trois fois par jour.

116. **EMPLOI** du tartre stibié contre les rhumatismes articulaires;

*Par le docteur Aran.*

| | |
|---|---|
| Tartre stibié, | 40 centigr. |
| Eau, | Q. S. |

Porter la dose de 40 à 60 le second jour.

117. **EMPLOI** du valérianate de zinc contre la catalepsie.

(*Formule du docteur Bo.*)

On emploie le valerianate de zinc à la dose de 1 gramme et 1 gr. 50 dans les vingt-quatre heures.

118. **ÉMULSION** iodée employée dans le service du Dr Ricord.

| | | |
|---|---|---|
| Huile d'amandes douces, | 30 | grammes. |
| Sirop diacode, | 30 | — |
| Gomme arabique, | 15 | — |
| Eau Q. S. pour 125 gr. d'emulsion. | | |
| Ajoutez teinture d'iode, | 4 | — |

119. **ÉMULSIONS** purgatives à l'huile de ricin;

*Par M. Thorel, pharmacien.*

| | | |
|---|---|---|
| 1° Huile de ricin, | 30 | grammes. |
| Sirop de limons ou autre, | 15 | — |
| Eau, | 30 | — |
| Gomme arabique pulvérisée, | 4 | — |
| 2° Huile de Ricin, | 45 | grammes. |
| Sirop de limons, | 25 | — |
| Eau, | 45 | — |
| Gomme pulvérisée, | 6 | — |
| 3° Huile de Ricin, | 60 | grammes. |
| Sirop de limons, | 30 | — |
| Eau, | 60 | — |
| Gomme pulvérisée, | 8 | — |

Peser l'huile et le sirop, verser sur la gomme, agiter vivement une ou deux minutes, mélanger l'eau peu à peu.

120. **EXTRAIT** de sang de bœuf.

*Préparation.*

On prend du sang de bœuf très frais, on l'agite jusqu'a ce qu'il soit refroidi, on le passe sur un tamis, et on l'évapore au bain marie a siccité complète sans cesser de remuer. Quand il est refroidi on le reduit en poudre.

121. **EXTRAIT** de viande.

M. Van Breslau a fait préparer un extrait de viande ainsi à la pharmacie royale de Munich.

On prend de la viande fraiche de bœuf, debarrassée, autant que possible, de sa graisse, hachée tres menue, et pilée dans un mortier de pierre avec de l'eau froide ou tiede, puis exprimee à l'aide d'une presse. Le residu est traité de la même manière. La viande, privée de son suc, peut être employee comme aliment, car mêlee convenablement avec des végetaux, cette viande est encore très nourrissante.

Le suc de viande, faiblement étendu d'eau, possède une couleur rougeâtre, il a une reaction légerement acide.

On le chauffe à 70° ou presqu'à l'ébullition, afin de coaguler l'albumine.

Le suc privé de l'albumine et écumé, est évaporé au bain-marie, en remuant sans cesse jusqu'a consistance d'extrait et conserve à la maniere des extraits des plantes. Comme la creatine dont la viande de bœuf ordinaire ne donne que 1 partie sur 1000, peut être obtenue, en plus grande quantité du cœur, (d'après Gryory, 1000 parties donnent 1,37–1,41 de créatine) comme elle est un des principes constituants de l'extrait de viande et que le cœur renferme les autres elements, on emploie les cœurs de bœuf.

122. **FOMENTATION** diurétique.

(*Formule de Christison.*)

| | | |
|---|---|---|
| Poudre de feuilles de digitale, | 30 | grammes. |
| Eau bouillante, | 600 | — |

F. S. A. Imbiber des compresses et appliquer sur l'abdomen et les membres infiltrés.

Digitized by Google

123. **FOMENTATIONS** avec le vin scillitique, contre l'hygroma chronique.

Le docteur Don Manuel Serrano est parvenu a faire disparaître deux fois un hygroma chronique par un traitement externe qui consiste exclusivement dans les fomentations de vin scillitique préparé comme suit : on fait macerer pendant quarante-huit heures deux onces de scille dans moitie (1,000 grammes) d'une azumbrede vin blanc. Il suffit d'appliquer sur la tumeur des compresses trempées dans ce liquide et très souvent répetées, de les maintenir au moyen de quelques tours de bande purement contentifs, sans qu'il soit nécessaire que le malade garde le repos. — Si les resultats obtenus par le médecin espagnol se confirment, il faudra ajouter un moyen de plus à la liste des topiques qui suffisent, dans certains cas, à déterminer la résorption du liquide renfermé dans les bourses séreuses.

124. **FORMULES** pour l'administration du tannin.

*Potion.*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 1 | gramme. |
| Eau distillée d'absinthe, | 100 | — |
| Eau de menthe, | 8 | — |
| Sirop de guimauve, | 30 | — |

A prendre par cuillerée toutes les trois heures.

*Poudre astringente*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 1 gr. 20 | centigr. |
| Poudre d'opium, | 60 | — |
| Seiglé ergoté, | 75 | — |
| Sucre blanc, | 15 gr. | — |

Dix paquets. Un toutes les quatre heures.

Pour les enfants, diminuer la dose de moitié; remplacer par la craie le seigle ergoté, à la dose de 2 grammes.

*Pilules.*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 1 gr. 25 | centigr. |
| Poudre d'opium, | 50 | — |
| Extrait de cigue, | 40 | — |
| Poudre d'épicacuanha, | 50 | — |

Dix pilules. Trois ou quatre par jour.

*Autre.*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 25 | centigr. |
| Opium, | 25 | — |

Cinq pilules. Une toutes les heures jusqu'a arrêt de l'hémorrhagie.

*Lotions.*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 60 | centigr. |
| Teinture de krameria-triandria, | 15 | grammes. |
| Eau de roses, | 45 | — |

*Pommade.*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 2 gr. 50 | centigr. |
| Sucre blanc pulvérisé, | 2 | grammes. |
| Essence de lavande, | 5 | gouttes. |
| Axonge récente, | 30 | grammes. |

*autre.*

| | | |
|---|---|---|
| Tannin, | 2 | grammes. |
| Soufre sublimé, | 60 | centigr. |
| Spermaceti, | 5 | grammes. |
| Axonge, | 60 | — |
| Essence de lavande, | 5 | gouttes. |

125. **FORMULE** modèle pour une potion au nitrate d'argent;

*Par M. Delioux.*

| | | |
|---|---|---|
| Blanc d'œuf, | 100 | grammes. |
| Eau, | 120 | — |

Filtrez à travers un linge fin.

Ajoutez ensemble après avoir dissous séparément les deux sels dans S. Q. d'eau distillee :

| | | |
|---|---|---|
| Azotate d'argent, | 0,05 | centigr. |
| Chlorure de sodium, | 0,05 | — |
| Sirop de sucre, | 30 | grammes. |

La dose du nitrate d'argent n'a rien d'absolu. La composition de la potion a pour but de ne causer aucune douleur ni aucun trouble dans les organes digestifs.

126. **FRICTIONS** de chloroforme dans le tétanos;

*Par le docteur Morisseau.*

Frictions avec 4 grammes de chloroforme en trois fois dans la journée.

Le soir bain de vapeurs acidulé.

Le lendemain frictions avec 20 grammes de chloroforme en trois fois.

Après cinq jours de traitement, guérison.

127. **FRICTIONS** employées contre les péritonites puerpérales;

*Par le docteur Vacca*

| | | |
|---|---|---|
| Baume tranquille, | 30 | grammes. |
| Iodure de potassium, | 2 | — |
| Iode, | 1 | — |
| Axonge, | 15 | — |

128. **FRICTIONS** employées contre les rhumatismes.

| | | |
|---|---|---|
| Chloroforme, | 10 | grammes. |
| Huile essentielle de térébenthine, | 20 | — |

Digitized by Google

129. **GANGRÈNE** de la bouche; son traitement.

*Par M. Van-Edden.*

*Potion.*

| | | |
|---|---|---|
| Sulfate de soude, | | |
| Vin stibié, | } ãã | 8 grammes. |
| Extrait de semences, | | |
| Sirop de séné, | 30 | — |

M. U. US. A prendre une cuillerée à café toutes les heures.

*Collatoire pour toucher les gencives.*

| | | |
|---|---|---|
| Teinture de cachou, | 4 | grammes. |
| Acide hydrochlorique, | 2 | — |
| Miel rosat, | 180 | — |

M. adus. ext.,

Quelques jours après.

*Collatoire.*

| | | |
|---|---|---|
| Infusion de fleurs de roses rouges, | 180 | grammes. |
| Alun cru, | 1 | — |
| Acide hydrochlorique, | 2 | — |
| Miel épuré, | 30 | — |

*Potion.*

| | | |
|---|---|---|
| Follic. de séné, | 5 | grammes. |
| Infusez dans eau, | 16 | — |
| Vin stibié, | 8 | — |
| Alcool aromatique, | 4 | — |
| Extrait de semences, | 7 | — |
| Sirop de séné, | 10 | — |

A prendre toutes les heures une cuillerée à café.

Quelques temps après, compresses mouillées par :

| | | |
|---|---|---|
| Acide pyroligneux, | 8 | grammes. |
| Miel rosat, | 180 | — |

Placer sur la joue :

| | | |
|---|---|---|
| Racine d'arnica, | 30 | — |
| Infusez dans eau, | 300 | — |
| Camphre, | 4 | — |
| Ajoutez miel épuré, | Q. S. | |
| Chlorure de chaux liquide, | 60 | grammes. |

130. **HUILE** de foie de morue; nouveau mode de l'administrer;

*Par M. Loge.*

| | | |
|---|---|---|
| Mucilage de légumine additionnée de 1/20 ou 1/24 de suc pancréatique, | 1 | gramme. |
| Huile de foie de morue, | 6 | — |

L'huile se solidifie, se sèche, se conserve et peut ensuite se délayer comme une sorte de chyle artificiel. Cette huile ainsi traitée est entièrement absorbée.

131. **HUILES** iodées;

*Par M. Bourgeois de Faverdax.*

| | | |
|---|---|---|
| Huile d'amandes douces, | 500 | grammes. |
| Iode, | 1 gr. 80 | centigr. |
| Ether rectifié, | 4 | grammes. |

Faites dissoudre l'iode dans l'éther et ajoutez la solution à l'huile. On met cette huile avec P. E. d'huile de foie de morue, on filtre et l'on a un produit clair et plus facile à prendre que l'huile de foie de morue.

*Autre.*

| | | |
|---|---|---|
| Huile d'amandes douces, | 500 | grammes. |
| Iode, | 80 | centigr. |

Triturez dans un mortier en verre l'iode, on ajoute l'huile peu à peu.

132. **HUILE** iodée destinée à remplacer l'huile de foie de morue.

(*Procédé de M. Personne.*)

On fait dissoudre 5 grammes d'iode dans 1 kilogramme d'huile d'amandes douces, puis on fait passer un courant de vapeur d'eau jusqu'a complete decoloration, puis on ajoute 5 grammes d'iode, on fait passer un courant de vapeur d'eau jusqu'a la decoloration complete.

Il est préferable de mettre l'iode par petites fractions, pour eviter que le produit ne reste coloré par suite de l'action de l'iode sur certains principes qui accompagnent l'huile.

Lorsqu'on agit ainsi, on n'aperçoit pas de trace de vapeur d'iode indiquant la déperdition. L'eau qui se condense, possède une action tres acide, due a l'acide chlorhydrique. On la décante d'abord, on lave l'huile avec un faible solute de bicarbonate de potasse et de soude jusqu'à ce que toute reaction acide soit disparue, enfin on laisse déposer et on filtre.

On pourrait, en ajoutant successivement des fractions d'iode, charger beaucoup plus l'huile mais quelles que soient les precautions prises, l'huile sera alors toujours colorée.

L'action de cette huile sur l'estomac, ne paraît avoir lieu qu'environ une heure et demie après qu'elle a été prise. Car lorsqu'on fait prendre 40 grammes d'huile d'iode médicinale (à 5 grammes d'iode pour 1000), la salive, après une heure et demie indique la présence de l'iode, car si l'on met cette salive en contact avec un peu d'empois et une goutte d'acide sulfurique, on a une coloration bleue, indiquant la présence de l'iode.

Digitized by Google

133. **HUILE** iodée médicinale.

*Mode de préparation de M. Deschamps.*)

| | |
|---|---|
| Huile douce d'amandes, | 100 grammes. |
| Solution alcoolique d'iode (au 12e), | 24 — |

Versez le mélange dans une cornue, introduisez-y une feuille de platine et distillez avec précaution, jusqu'à décoloration, retirez le liquide de la cornue, lavez-le avec de l'eau contenant un millième de son poids de bicarbonate de soude, puis à l'eau simple, agitez l'huile avec 2 grammes d'amidon, chauffez au bain-marie pendant une heure, filtrez et conservez.

100 grammes de cette huile, contiennent 52 centigr. d'iode.

134. **INFUSION** antidyssentérique de yalhoy;

*Par M. Ruiz.*

| | |
|---|---|
| Écorces concassées de yalhoy, | 6 grammes. |
| Eau bouillante, | 500 — |

Laissez infuser une heure, en agitant de temps en temps, filtrez à travers un linge; à prendre en deux doses.

135. **INFUSION** d'ipécacuanha dans la dysseuterie.

(*Méthode brésilienne.*)

| | |
|---|---|
| Poudre ou racine concassée d'ipéca, | 2 à 8 grammes, selon l'énergie qu'on veut donner à la medication. |

Verser dessus 200 à 300 grammes d'eau bouillante : laisser infuser 10 a 12 heures; décanter avec précaution, verser sur le marc une nouvelle quantité d'eau bouillante, decanter après l'infusion et opérer une troisième fois de même Chaque infusion sert pour un jour : on masque par du sucre et de l'eau de fleurs d'oranger la saveur desagréable du médicament.

On emploie aussi la décoction suivante :

| | |
|---|---|
| Ipéca, | (selon le cas.) |
| Eau bouillante (15 minutes), | 300 à 400 grammes. |

136. **INFUSION** employée dans le traitement de la pneumonie.

(*Formule du docteur Ressiguier.*)

| | |
|---|---|
| Ipécacuahna, de | 1 gr. 50 à 3 gram. |
| Eau, | 120 gr. à 180 — |

A prendre toutes les heures.

On ajoute quelquefois à cette infusion :

| | |
|---|---|
| Sirop diacode, | 15 à 30 grammes. |

137. **INJECTIONS** ammoniacales contre l'aménorrhée;

*Par M. Broussonnet.*)

M. le professeur Broussonnet de Montpellier, vient de retirer de l'oubli les injections ammoniacales autrefois très vantées contre l'aménorrhée et tombées dans l'oubli, on ne sait trop pourquoi.

Voici en quoi elles consistent : la malade s'injecte trois ou quatre fois par jour dans le vagin 10 à 12 gouttes d'ammoniaque étendues dans trois ou quatre cuillerées de lait. Ces injections ne réussissent qu'à la condition de produire un peu de douleur. On devra donc augmenter la dose de l'ammoniaque s'il ne se produit pas de douleur, la diminuer au contraire, s'il s'en produit trop. Ces injections ne sont commencées que deux ou trois jours avant l'époque des règles et sont suspendues dès que celles-ci paraissent ou dès que leur époque est passée.

138. **INJECTIONS** ammoniacales contre l'amenorrhée.

(*Formule de Lavagna.*)

| | |
|---|---|
| Lait chaud, | 2 cuillerées. |
| Ammoniaque liquide, | 10 ou 12 gouttes. |

(*Formule de M. Nicato.*)

| | |
|---|---|
| Ammoniaque liquide, | 40 gouttes. |
| Mucilage de gomme arabique, | 15 grammes. |
| Decoction d'orge, | 400 — |

Il faut ne pas exagérer la quantité d'ammoniaque qui est ici peut-être même un peu irritante.

139. **INJECTIONS** astringentes contre la blennorrhagie;

*Par le docteur Ricord.*

| | |
|---|---|
| Tannin, | 50 grammes. |
| Sulfate de zinc, | 50 — |
| Eau de roses, | 200 — |

Deux ou trois injections par jour.

140. **INJECTIONS** astringentes contre la blennorrhagie.

(*Formule de M. Vidal.*)

| | |
|---|---|
| Eau de roses, | 200 grammes. |
| Azotate d'argent, | 2 décigr. |

Digitized by Google

*Autre.*

| | |
|---|---|
| Eau de roses, | 200 grammes. |
| Sous-acétate de plomb, | 50 centigr. |
| Sulfate de zinc, | 50 — |

De deux à quatre injections par jour.

141. **INJECTIONS** astringentes;

*Par M. Bodart.*

| | |
|---|---|
| Sulfate de fer, | 125 grammes. |
| Sulfate d'alumine et de potasse, | 125 — |
| Sulfate de zinc, | 24 — |
| Hydro chlorate d'amoniaque, | 24 — |
| Acétate de cuivre, | 24 — |

On concasse tous ces sels, on les fait fondre dans leur eau de cristallisation; quand la fusion est terminée, on coule le tout sur un marbre comme on le fait pour la pierre-divine, on pulvérise et on passe au tamis.

Pour obtenir l'injection on prend de 6 à 10 grammes qu'on fait dissoudre dans 250 grammes d'eau distillée.

142. **INJECTIONS** iodées dans l'ascite;

*Par le docteur Costes.*

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 100 grammes. |
| Teinture d'iode, | 20 — |
| Iodure de potassium, | 2 à 4 — |

143. **INJECTIONS** préparées avec l'alun.

Le sulfate d'alumine et de potasse est un astringent qui est utilement employé contre la blennorrhée en injections et aussi en lotions contre les ephelides, les excoriations de la peau et les engelures.

INJECTIONS ALUMINEUSES FULIGINÉES.

| | |
|---|---|
| Décoction de suie, | 500 |
| Alun, | 15 |
| Eau, | 184 |

F. S. A.

Contre les fleurs blanches.

INJECTION PAR L'URÈTRE (*Ricord*).
INJECTIONS ALUMINEUSES.

| | |
|---|---|
| Eau de roses, | 190 grammes. |
| Alun, | 1 — |

F. S. A.

INJECTION PAR LE VAGIN (*Ricord*).

| | |
|---|---|
| Eau, | 1,000 grammes. |
| Sulfate d'alumine, | 2 — |

F. S. A.

LOTIONS ASTRINGENTES (*Foy*).

| | |
|---|---|
| Sulfate de zinc, | 4 grammes. |
| Sulfate d'alumine, | 4 — |
| Eau de plaintain, | 500 — |

F. S. A.

Contre les taches de rousseur et les engelures.

144. **IODURE** d'amidon soluble;

*Par M. Brun-Buisson, pharmacien à Voiron.*

| | |
|---|---|
| Iode, | 1 gramme. |

Triturer dans un mortier de verre et ajouter successivement:

| | |
|---|---|
| Amidon, | 9 grammes. |

Placer le tout intimement mélangé dans une marmite de fonte à l'intérieur émaillée, avec un couvercle luté et assujetti par un fil de fer, précaution nécessaire pour éviter une explosion quand l'amidon perd de son humidité. Placer l'appareil dans un brasier à demi incinéré et retirer au bout d'une demi-heure. Le tout étant refroidi, on trouve un produit bleu noir velouté double en volume qui recueilli, lavé à l'alcool absolu et séché est conservé pour l'usage.

145. **IODURE** d'amidon soluble;

*Par M. Bodart.*

| | |
|---|---|
| Poudre d'amidon tamisée, | 9 parties. |
| Iode, | 1 — |

Mélangez par petites portions l'amidon avec l'iode; quand la mixture est intimement faite, humectez légèrement la poudre iodurée avec un peu d'eau distillée; introduisez ce mélange dans une cornue, bouchez-la légèrement, plongez-la dans un bain-marie d'eau bouillante, et laissez l'iodure soumis à cette action pendant quatre heures consécutives, en agitant de temps en temps la cornue.

L'opération terminée, lavez avec l'alcool environ un litre pour 500 grammes de poudre; après ce lavage, filtrez, faites sécher et conservez pour l'usage dans un flacon bleu bouché à l'émeri.

146. **IODURE** d'amidon soluble.

(*Procédé de M. Duboys, de Limoges.*)

| | |
|---|---|
| Triturez-iode, | 20 grammes. |
| Amidon non torréfié, | 180 — |

On ne l'ajoute à l'iode que par petites quantités. On humecte ce mélange avec un peu d'eau, on l'introduit dans un

Digitized by Google

ballon on chauffe au bain-marie. Le ballon est plongé jusqu'au col. De temps en temps on le retire on l'agite on essaye si l'iodure devient soluble. Il faut au plus trois heures pour avoir l'iodure complètement et instantanément soluble dans l'eau.

L'iodure se trouve dans le ballon à l'état de pâte épaisse tenace et élastique qu'on lave sur un filtre plusieurs fois à l'alcool rectifié et qu'on dissout soit à l'étuve soit à l'air libre.

L'iodure est après sa dessiccation, noir, brillant, presque inodore, presque cristallisé et friable ; réduit en poudre il conserve son brillant. Cette poudre s'attache aux doigts et les bleuit s'ils sont humides. La solution dans l'eau est d'un bleu de cyanure de fer, mais elle n'est pas bleu lie de vin.

Ce procédé peut s'appliquer avec quelques modifications à la préparation des iodures de fer et de soufre.

147. **JULEP** avec le tartre stibié contre le pneumonie avec le délirium tremens ;

*Par M. Sandras.*

Un homme âgé de quarante-deux ans avait été pris de pneumonie pour laquelle on lui avait pratiqué trois saignées. La pneumonie n'en marcha pas moins et de plus il survint un délire violent avec tremblement des extrémités supérieures, agitation, sueurs profuses.

Il fut porté dans cet état à l'hôpital Beaujon où l'on constata du souffle dans un côté ; M. Sandras prescrivit aussitôt un julep contenant :

| | |
|---|---|
| Tartre stibié, | 30 centigr. |
| Sirop diacode, | 50 grammes. |
| Vin de Bagnols, | 45 — |

A prendre dans les vingt-quatre heures. Le premier julep procura un peu de calme, un second amena le sommeil et la cessation du delire ; en même temps la pneumonie perdait de son intensité. Troisième julep auquel on ajoute l'application d'un vésicatoire volant sur un point circonscrit du thorax où le souffle persistait. Convalescence le cinquième jour. On supprime le tartre stibié et le sirop diacode, mais on continue le vin de Bagnols. Le malade a quitté l'hôpital quelques jours plus tard dans un état parfait de guérison.

148. **JUS** de plantain dans les fièvres intermittentes rebelles ;

*Par le docteur Cheuvreuse.*

Un quart de verre de jus de plantin avant le frisson, et de même à chaque accès.

149. **LAVEMENTS** albumineux au chlorure d'argent dans les flux intestinaux.

(*Formule de M. Delioux.*)

| | |
|---|---|
| Blanc d'œuf, | n° 1. |

On dissout dans :

| | |
|---|---|
| Eau distillée, | 250 grammes. |

On filtre sur un linge et on prend :

| | |
|---|---|
| Azotate d'argent cristallisé, | 10, 20, 30 centigr. |
| Chlorure de sodium, | 10, 20, 30 . — |

On dissout séparément les deux sels dans très peu d'eau distillée : on verse la solution de nitrate d'argent dans le liquide albumineux : il se fait un précipité floconneux, on ajoute le chlorure de sodium en agitant, le précipité se dissout et le liquide reste légèrement opalin. On peut se servir d'une seringue de metal. Cette solution ne doit pas etre preparée d'avance.

150. **LAVEMENT** antidyssentérique de yalhoy ;

*Par M. Ruyn.*

| | |
|---|---|
| Ecorces d'yalhoy concasées, | 16 gram. |
| Eau de fontaine, | 1,000 grammes. |

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un quart, passez en exprimant à travers un linge

Pour deux lavements.

151. **LAVEMENTS** contre les hernies étranglées ;

*Par M. Maeyer.*

| | |
|---|---|
| Huile de croton, | 10 gouttes. |
| Huile de ricin, | 8 grammes. |
| Huile de menthe, | 1 — |

Mêlez.

Prendre en deux fois de deux heures en deux heures. L'huile de menthe est prescrite pour prévenir le vomissement.

152. **LAVEMENT** contre l'ivresse ;

*Par M. Lalaux*

| | |
|---|---|
| Sel gris, | 2 cuillerées à bouche. |
| Eau tiède, | 4 verres. |

Pour un lavement.

Digitized by Google

153. **LAVEMENT** employé contre la blennorhagie cordée.

(*Formule de M. Vidal.*

| | |
|---|---|
| Camphre, | 5 décigr. |
| Extrait d'opium, | 4 centigr. |
| Jaune d'œuf, | n° 1 |
| Eau, | 160 grammes. |

154. **LIMONADE** tartro-sodique;

*Par M. Desvignes.*

| | |
|---|---|
| Bicarbonate de soude, | 35 grammes. |
| Acide tartrique cristallisé, | 35 — |
| Eau de fontaine, | 450 — |
| Sirop de sucre, | 60 — |
| Teinture de zeste de citron, | 20 gouttes. |

155. **LINIMENT** au nitrate d'argent contre les brûlures.

Ce remède fut employé par le docteur Kalt dans les circonstances suivantes :

Un homme avait, pendant un incendie, été atteint par la chute d'une toiture enflammée. Le visage, la poitrine, le ventre, les extrémités étaient tuméfiés : larges ampoules, dont plusieurs dépouillées de leur épiderme; douleurs violentes, pouls fébrile. L'épiderme fut détaché des parties malades, sur lesquelles on appliqua avec une barbe de plume la mixture suivante :

| | |
|---|---|
| Nitrate d'argent fondu, | 8 grammes. |
| Faites dissoudre dans eau distillée, | Q. S. |
| Huile de lin, | 250 grammes. |

Une heure après la première application, les douleurs avaient presque entièrement disparu; la surface était recouverte d'une croûte brunâtre, sèche, et à peu près insensible au toucher. Le deuxième jour, cessation complète des douleurs. Le cinquième jour, le gonflement n'existe plus; le malade ouvre les yeux; pas de trace de suppuration. Au quatorzième jour, l'épiderme artificiel formé par la mixture s'écailla, et laissa voir la peau parfaitement reparée.

Dans deux autres faits rapportés par l'auteur, les résultats furent aussi favorables. Le nitrate d'argent ainsi employé avec l'huile forme une couche protectrice, qui a l'avantage d'être élastique; tandis que la solution aqueuse se brise par places et ne recouvre les parties malades qu'incomplétement.

156. **LINIMENT** économique contre la gale;

*Par le docteur Courbassier.*

4 cuillérées à bouche de suie de cheminée tamisée.
1 cuillerée de sel de cuisine.
1 cuillerée de fleur de soufre.
Mêlez.

Delayer chaque soir une cuillerée du mélange avec Q. S. d'huile d'olive, se frictionner tout le corps, et garder le même linge pendant tout le traitement, qui est de six jours. Le septième se laver avec de l'eau légèrement vinaigrée.

157. **LIQUIDE** préservatif contre la syphilis.

(*Formule de M. Langlebert.*)

Alcool à 36°,
Savon mou de potasse avec excès de base, } aa 40 grammes.

Faites dissoudre et filtrez, puis ajoutez :

Huile essentielle de citron, 20 grammes.

L'application de ce liquide doit durer deux minutes, puis on lave à l'eau fraîche.

158. **LIQUEUR** de cuivre muriato-ammoniacale, *tinctura salis ammoniaci cuprifera*; liqueur de Kœchlin contre l'épilepsie.

| | |
|---|---|
| Chlorure de cuivre, | 4 grammes. |
| Sel ammoniac, | 15 — |
| Eau, | 150 — |

On l'emploie aussi au pansement des ulcères vénériens.

159. **LOOCH** huileux.

(*Formule de M. Thorel, pharmacien.*)

| | |
|---|---|
| Huile d'amandes douces (récente), | 30 grammes. |
| Gomme pulvérisée, | 30 — |
| Sirop simple, | 50 — |
| Eau, | 60 — |
| Eau de laurier-cerise, | 5 — |

Peser l'huile et le sirop, verser sur la gomme, agiter vivement une ou deux minutes, puis mélanger l'eau peu à peu.

160. **LOTIONS** alcalines contre l'acné varioliforme de la face et du cou;

*Par M. Bazin.*

| | |
|---|---|
| Eau commune, | 500 grammes. |
| Carbonate de potasse, | 2 — |

Digitized by Google

Le malade passe deux fois par jour sur les boutons de la face et du cou, une éponge fine imbibée de la lotion.

161. **LOTIONS** antidartreuses;

*Par M. Néligan.*

Huile essentielle de citron, 8 grammes.
Huile de romarin, 4 —
Alcool rectifié, 1,000 —

On se sert de cette formule après s'être lavé avec une solution alcaline.

162. **LOTIONS** contre la gangrène de la région sacrée.

(*Formule de M. Miquel d'Amboise.*)

Perchlorure de mercure, 5 centigr.
Alcool, 30 grammes.

On lotionne trois ou quatre fois par jour avec ce liquide les endroits exposés à être frappés de gangrène.

On doit tenir avec la plus grande propreté les malades qui sont forcés de laisser les parties du corps exposées à une pression très prolongée.

On doit encore, malgré ces lotions, essayer de faire prendre au malade une position qui puisse faire varier les parties du corps sur lesquelles on l'appuie.

163. **LOTIONS** contre l'acné indurata.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Eau distillée, 250 grammes.
Bichlorure de mercure de 25 à 30 centigr.

164. **LOTIONS** ammoniacales;

(*Formule de M. Cazenave.*)

Eau, 1 litre.
Sel ammoniacal hydrochlorate ou acétate, 15 à 20 grammes.

165. **LUPULINE** contre les érections morbides.

(*Formule de M. Paye.*)

Lupuline, 2,5 grammes.
Mucilage, Q. S.

F. S. A. Dix pilules, en prendre une ou deux chaque soir.

166. **MÉLANGE** contre le psoriasis et le prurigo.

(*Formule de M. Lafond-Gouzi.*)

Huile pyrogenée de houille, 8 grammes.
Huile de jusquiame opiacée, 30 —

Faire selon l'art un mélange,

167. **MÉLANGE** de sulfate de cuivre et de sabine contre les végétations syphilitiques.

Sulfate de cuivre, } parties égales.
Sabine, }

On saupoudre les végétations avec ce mélange.

168. **MIXTURE** avec la belladone; préservatif des attaques épileptiques.

Eau simple, 190 grammes.
Extrait de belladone, 2 décigr. 5 centigr.

Faites une mixture. On en administre par jour trois cuillerées à bouche aux individus chez lesquels on veut empêcher les accès.

169. **MIXTURE** contre le hoquet;

*Par M. Marage.*

Huile d'amandes douces, 60 grammes.
Chloroforme, 20 gouttes.
Sirop diacode, 30 grammes.
Sirop de menthe poivrée. 12 —

A prendre une cuillerée à café toutes les trois heures.

170. **MIXTURE** de fer composée de la pharmacopée de Londres.

Myrrhe pulvérisée, 8 grammes.
Carbonate de potasse, 4 —
Eau de roses, 432 —
Sulfate de fer, 3 —
Esprit de muscade, 24 —
Sucre, 8 —

Triturez la myrrhe avec l'alcool et le carbonate, ajoutez l'eau, puis le sulfate, et enfin le sucre.

171. **MIXTURE** au sulfate de quinine rendu soluble par l'acide tartrique;

*Par M. Casorati.*

Sulfate de quinine, 60 centigrammes.
Acide tartrique, 20 à 30 — au plus.
Sirop d'oranges ou de menthe, 45 grammes.

Faire selon l'art une potion par cuillerée toutes les deux heures (pour un adulte).

172. **NITRATE** d'argent employé contre la dyssenterie;

*Par M. Butignot.*

Eau distillée, 40 grammes.
Nitrate d'argent cristall. 2 centigr.
Sirop, 15 —

Digitized by Google

Cette mixture se prend par cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

### 173. ONGUENT basilicum.

*Par M. Hainaut.*

Poix noire,
Colophane,
Axonge.

Fondre la poix, la colophane, ajouter l'axonge et passer à travers un linge.

### 174. ONGUENT mercuriel double.

(*Formule de M. Motte pharmacien.*)

| | |
|---|---|
| Mercure vif, | 500 grammes. |
| Axonge de porc, | 500 — |
| Styrax liquide, | 10 — |

On triture le mercure avec le styrax pendant dix minutes dans un mortier de marbre chauffé; on ajoute de cinq en cinq minutes 2 a 3 onces d'axonge et on obtient une pommade mercurielle avec extinction complète du mercure.

### 175. OPIAT balsamique contre les uréthrites et les flueurs blanches.

(*Formule de M. Bodart.*)

| | |
|---|---|
| Cire blanche, | 280 grammes. |
| Faites fondre dans l'huile d'amandes douces, | 280 — |

D'autre part delayez dans une terrine pouvant supporter l'action du feu.

| | |
|---|---|
| Alun pulverisé, | 32 grammes. |
| Poivre cubèbe en poudre | 90 — |
| Baume de copahu, | 656 — |

Placez la terrine sur un feu doux, opérez le mélange peu à peu, et versez, pendant que la mixture est échauffée, la solution de cire en remuant continuellement. Ajoutez ensuite de la même manière et en agitant toujours, terebenthine fine 90 grammes, versez en dernier lieu, baume du Pérou noir liquide, 45 grammes, et huile essentielle d'anis 2 grammes, mêlez intimement et distribuez le mélange dans des pots. Cet opiat qui s'administre a la dose de trois doses par jour, gros comme une noisette, enveloppé dans un peu de pain azyme, n'a pas l'aspect ni l'odeur desagréables des autres opiats de ce genre. C'est une preparation qui reussit mieux que tous les medicaments livrés à la pharmacie par les specialistes.

### 176. OPIUM à haute dose contre la méningite cérébro-spinale épidémique.

(*Formule de M. le docteur Bailly.*)

On commence le traitement par :

| | |
|---|---|
| Extrait d'opium, | 2 ou 3 décigr. |
| Liquide en une fois, | 20 grammes. |

Puis toutes les demi-heures par prises de 5 centigrammes jusqu'à un assoupissement leger.

L'opium doit dès lors être supprimé dès que les phenomènes encéphaliques cessent.

### 177. PILULES balsamo-alcalines.

(*Formule de M. le docteur Delioux.*)

| | |
|---|---|
| Baume de Tolu, | 50 grammes. |
| Bicarbonate de soude, | 25 — |
| Sucre, | 175 — |

Pour 1000 pilules de 25 centigrammes contenant chaque.

| | |
|---|---|
| Baume de Tolu, | 5 centigr. |
| Bicarbonate de soude, | 25 — |
| Sucre, | 175 — |

On peut selon les diverses maladies ajouter à la masse pilulaire de 250 grammes :

| | |
|---|---|
| 1° Opium, | 50 centigr. |
| 2° Kermès minéral, | 2 gr. 50 — |
| 3° Ipécacuanha, | 2 — 50 — |

### 178. PILULES de carbazotate de potasse contre les fievres intermittentes;

*Par le docteur Degouzée.*

Carbazotate de potasse, 0,30 0,60 1,20 2,00 grammes.

Mettre en pilules.

### 179. PILULES contre la blennorrhagie cordée.

(*Formule de M. Vidal.*)

| | |
|---|---|
| Camphre, | 10 à 30 centigr. |
| Extrait d'opium, | 2 1/2 à 5 — |
| Mucilage, | Q. S. |

Pour une pilule.

On prend deux ou trois pilules par jour en commençant après midi.

### 180. PILULES diurétiques;

*Par M. Debreyne.*

| | |
|---|---|
| Poudre de digitale, | 12 grammes. |
| Scammonée, | 6 — |
| Scille pulvérisée, | 6 — |
| Extrait de genièvre, | Q. S. |

Faites 100 pilules.

Une le premier jour, deux le second, jusqu'a six par jour et en trois fois, deux le matin, deux à midi, deux le soir.

Digitized by Google

181. **PILULES** employées dans les affections utérines;

*Par M. Gendrin.*

| | |
|---|---|
| Hydrargyre métallique, | 3 grammes. |
| Miel, | 2 — |
| Gomme arabique; | |

Triturez pour faire soixante pilules.

Boire chaque jour 2 litres de tisane de salsepareille.

182. **PILULES** de goudron;

*Par M. Cazenave.*

| | |
|---|---|
| Goudron, | 2 grammes. |
| Poudre de réglisse, | 1 — |

F. S. A. 40 pilules.

Prendre de une à trois par jour.

183. **PILULES** d'onguent mercuriel contre la phthisie;

*Par le docteur Lecouppey.*

| | |
|---|---|
| Pommade hydrargyre (Codex 559, | 1 gramme. |
| Jaune d'œuf frais, | 40 centigr. |
| Poudre de réglisse, | Q. S. |

Faire vingt pilules.

Aux petits enfants, 5 centigrammes au plus d'onguent dans les vingt-quatre heures dans un loock par petite cuillerée.

184. **PILULES** purgatives contre certaines suffusions séreuses;

*Par le docteur Champouillon.*

| | |
|---|---|
| Résine de jalap, | 20 centigr. |
| Résine de scammonnée, | 20 — |
| Gomme gutte, | 10 — |
| Scillerine, | 20 — |
| Suc d'ail, | 4 grammes. |

Faire quatre pilules à prendre par deux à un intervalle d'une heure.

185. **PILULES** de quinoïdine contre les fièvres intermittentes.

(*Formule de M. Lewis Stuller.*)

| | |
|---|---|
| Quinoïdine, | 32 grammes. |
| Acide tartrique, | 2 — |
| Quinquina rouge en poudre, | 8 — |
| Cascarille en poudre, | 8 — |
| Poudre de racine de valériane, | 8 — |
| Extrait de quassia-amara, | 15 — |
| Extrait de gentiane, | 15 — |
| Mucilage de gomme, | Q. S. |

Faites 480 pilules, on en prend seize par jour. Pour un adulte, deux toutes les trois heures, en commençant immédiatement après la cessation de l'accès et en continuant jusqu'à guérison.

186. **PILULES** au sulfate de quinine dans la dysménorrhée;

*Par M. Tilt.*

| | |
|---|---|
| Sulfate de quinine, | 50 centigr. |
| Extrait de gentiane, | 1 gr. 20 — |
| Extrait d'aloès, | 50 — |
| Extrait de jusquiame, | 1 gr. 20 — |

Pour dix pilules, deux par jour.

187. **POMMADE** antisporique;

*Par M. Delahaye d'Aulnay sur Odon.*

| | |
|---|---|
| Carbonate de potasse, | 30 grammes. |
| Soufre sublimé, | 60 — |
| Essence de lavande, | 30 — |
| Huile de camomille, | 40 — |

Broyez le carbonate avec l'huile de camomille, ajoutez le soufre et l'essence de lavande.

Cinq à six frictions à faire.

188. **POMMADE** au calomel et à la poudre d'amidon camphré, dans le prurit des parties génitales;

*Par M. Tournié.*

| | |
|---|---|
| Calomel, | 4 grammes. |
| Axonge, | 30 — |

Deux frictions par jour sur la partie débarrassée de croûtes par le moyen de cataplasmes et de bains émollients; et après chaque friction, saupoudrer la partie malade avec la poudre suivante :

| | |
|---|---|
| Poudre d'amidon, | 4 parties. |
| Camphre pulvérisé, | 1 — |

M. Tournié, dans un cas très rebelle, a porté la dose de calomel à 8 grammes pour 30 d'axonge. Il ajouta 1 gramme de camphre, et la poudre fut faite avec parties égales de camphre et d'amidon.

189. **POMMADE** avec l'huile pyrogénée.

(*Formule de M. Lafond-Gouzé*) (1).

| | |
|---|---|
| Axonge, | 30 grammes. |
| Huile pyrogénée, | 8 — |

Faites un mélange exact.

Cette pommade s'emploie dans le traitement de l'eczema.

Dans le prurigo on remplace l'axonge par de l'huile de jusquiame opiacée.

(1) M. Payen père faisait employer l'eau saturée d'huile empyreumatique contre les maladies de la peau.

Digitized by Google

190. **POMMADE** contre l'acné rosacéa;

*Par M. Néligan.*

| | |
|---|---|
| Ammoniochlorure de mercure, | 60 centigr. |
| Pommade de spermaceti, | 30 grammes. |
| Huile essentielle d'amandes amères, | 3 gouttes. |

On l'applique le soir après s'être lavé avec une solution alcaline.

191. **POMMADE** contre l'acné indurata;

*Formule de M. Cazenave.*

| | |
|---|---|
| Iodure de soufre, | 1 à 2 grammes. |
| Axonge pure, | 80 — |

Mêlez exactement.

192. **POMMADE** contre l'acné varioliforme;

*Par M. Bazin.*

| | |
|---|---|
| Axonge, | 30 grammes. |
| Carbonate de potasse. | 3 — |

Plusieurs frictions par jour.

193. **POMMADE** contre l'eczema.

(*Formule de M. Lafond Gouzé.*)

| | |
|---|---|
| Huile pyrogénée de houille, | 8 grammes, |
| Axonge, | 30 — |

Mêlez.

194. **POMMADE** épispastique;

*Par M. Bodart.*

| | |
|---|---|
| Poudre de cantharides, | 180 grammes. |
| Faites infuser pendant deux heures dans huile d'olives, | 1,000 — |
| Passez à travers un linge, faites fondre dans cette huile cantharidée, cire jaune, | 500 — |
| Onguent populeum, onguent basilium et terebenthine ordinaire, | 375 — |

Remuez le mélange hors du feu jusqu'a refroidissement.

195. **POMMADE** d'extrait de belladone contre l'érysipèle du cuir chevelu;

*Par M. Gauneau.*

| | |
|---|---|
| Axonge, | 30 grammes. |
| Extrait de belladone, | 2 — |

196. **POMMADE** au chloroforme contre le prurit à la vulve.

| | |
|---|---|
| Chloroforme, | 5 grammes. |
| Pommade de concombre, | 40 — |
| Essence de rose, | 4 gouttes. |

Cette pommade doit être souvent renouvelée.

197. **POMMADE** au goudron dans les maladies de la peau;

*Par M. Cazenave.*

| | |
|---|---|
| Goudron, | 4 à 10 grammes. |
| Axonge, | 30 — |

En friction sur les plaques malades.

*Autre.*

| | |
|---|---|
| Onguent citrin, | 10 grammes. |
| Goudron, | 10 — |
| Axonge, | 10 — |

En friction sur les plaques squammeuses, moins largement que la précédente.

198. **POMMADE** à l'oxyde noir de mercure, comme succédané de l'onguent mercuriel;

*Par M. Berensprung.*

| | |
|---|---|
| Oxyde noir de mercure, | 5 centigr. |
| Axonge, | 4 grammes. |

M. Berensprung a reconnu que le mercure, si divisé qu'il soit, est incapable de traverser les tissus cutanés, tandis que le mercure protoxydé, se dissolvant dans les acides des sécrétions, est emporté à travers les membranes et les cellules de l'épiderme, jusque dans les parties les plus intimes de l'économie. La quantité de ce protoxyde n'a pas besoin d'être considérable pour produire de grands effets, car 1 gramme 20 d'une pommade composée avec

| | |
|---|---|
| Axonge, | 8 grammes. |
| Oxyde noir de mercure, | 4 — |

suffit pour faire périr un chat en quatre jours et un lapin en vingt-quatre heures.

199. **POMMADE** au sulfure de chaux contre l'herpès tonsurant, dans les cas invétérés;

*Par le docteur Cazenave.*

| | |
|---|---|
| Sulfure de chaux, | 2 à 4 grammes. |
| Axonge, | 30 — |

Mêlez.

On commence par 2 grammes, et on ne fait quelquefois de frictions que deux fois par semaine. On lave les parties

Digitized by Google

malades avec un peu d'eau de savon tiède, ou de l'eau légèrement alcaline.

200. **POMMADE** au soufre lavé contre l'herpès tonsurant;

(*Formule du docteur Cazenave.*)

| | |
|---|---|
| Soufre lavé, | 4 grammes. |
| Huile d'amandes douces, | 2 — |
| Cérat de Galien, | 30 — |

F. S. A. Cette formule convient surtout pour les jeunes enfants.

Frictions tous les jours.

201. **POMMADE** au turbith minéral contre l'herpès tonsurant;

*Par le docteur Cazenave.*

| | |
|---|---|
| Turbith minéral, | 2 grammes. |
| Soufre sublimé, | 4 — |
| Cérat de Galien, | 30 — |

F. S. A.

On peut porter la dose de turbith à 4 grammes, et celle du soufre à 8. Frictions tous les jours.

202. **POMMADE** contre la fissure anale;

*Par M. Campagnac.*

| | |
|---|---|
| Onguent de la mère, | 50 grammes. |
| Huile d'amandes, | 50 — |

F. S. A.

Introduisez des mèches enduites de ce mélange.

203. **POMMADE** contre l'herpès;

*Par M. Cazenave.*

| | |
|---|---|
| Sulfure de chaux, | 2 à 4 grammes. |
| Axonge; | 30 — |

Mêlez.

Il vaut mieux commencer par 2 gr., et ne faire que deux frictions par semaine.

204. **POMMADE** de la veuve Farnier.

*Formule de M. Viel.*

| | |
|---|---|
| Oxyde rouge de mercure, | 1 gramme. |
| Acétate de plomb cristallisé, | 1 — |
| Beurre frais lavé à plusieurs reprises à l'eau de roses, | 8 — |

Faire selon l'art, une pommade.

205. **POTION** à l'ammoniure de cuivre contre la danse de St-Guy.

| | |
|---|---|
| Ammoniure de cuivre, | 40 centigr. |
| Eau, | 80 grammes. |
| Sirop simple, | 50 — |

On ajoute une petite quantité de sirop d'opium.

Prendre par cuillerées deux ou trois fois par jour, et augmenter jusqu'à prendre la potion en vingt-quatre heures.

206. **POTION** à l'acide gallique contre le purpura hémorrhagica.

| | |
|---|---|
| Acide gallique, | 2 grammes. |
| Teinture d'opium, | 5 — |
| Eau distillée, | 14 gouttes. |

Toutes les demi-heures.

Le malade gueri en avait pris environ 30 grammes en vingt-quatre heures.

207. **POTION** au sulfate de zinc contre la chorée;

*Par M. Barlow.*

| | |
|---|---|
| Sulfate de zinc, Pilules de galbanum, Extrait de jusquiame, | ää 10 centigr. |

Augmenter la dose du sulfate de zinc si l'on le juge convenable.

208. **POTION** contre la colique de plomb;

*Par M. le docteur Brachet.*

| | |
|---|---|
| Alun, | 4 à 8 grammes. |
| Laudanum de Sydenham, | 40 à 50 gouttes. |
| Potion gommeuse. | |

F. S. A.

209. **POTION** contre la diarrhée des enfants;

*Par M. le docteur West.*

| | |
|---|---|
| Huile de ricin, | 4 grammes. |
| Poudre de gomme arabique, | 75 centigr. |
| Sirop simple, | 4 grammes. |
| Teinture d'opium, | 4 gouttes. |
| Eau de fleur d'oranger, | 28 grammes. |

Mêlez.

Une cuillerée à thé tous les quarts d'heure. Cette formule convient aux enfants d'un an; lorsque l'estomac la tolère, nul moyen n'est plus utile.

210. **POTION** employée contre la suette miliaire.

*Formule du docteur Baudon.*

| | |
|---|---|
| Eau de tilleul, | 100 grammes. |
| Sirop diacode, | 30 — |
| Eau de fleurs d'oranger, | 4 — |
| Liqueur d'Hoffmann, | 1 — |

Une cuillerée toutes les demi-heures.

Digitized by Google

211. **POTION** avec l'hydrochlorate d'ammoniaque pour combattre les accès de fièvre.

(*Formule de M. Aran.*)

| | | |
|---|---|---|
| Hydrochlorate d'ammoniaque, | 8 | grammes. |
| Eau distillée de menthe, | 50 | — |
| Eau de fleurs d'oranger, | 50 | — |

F. S. A.

A prendre en deux fois, à deux heures d'intervalle, on peut avaler après chaque dose une petite tasse de café sucré pour annihiler le goût du sel ammoniaque.

212. **POTION** contre le tœnia;

*Par le docteur Budd.*

| | | |
|---|---|---|
| Huile éthérée de fougère, | 30 | grammes. |
| Eau gommée, | 25 | — |

Deux heures après, on donne :

| | | |
|---|---|---|
| Huile de ricin, | 30 | grammes. |

213. **POTION** employée dans une suite de couches;

*Par M. Bouchacourt.*

| | | |
|---|---|---|
| Eau de laitue et de tilleul, de chaque, | 60 | grammes. |
| Acétate d'ammoniaque, | 1 | — |
| Eau de cannelle orgée, | 8 | — |
| Laudanum de Sydenham, | 25 | gouttes. |
| Sirop de gomme, | 30 | grammes. |

Mélangez avec glace pilée et sucrée parties égales. Une cuillerée à café de temps en temps.

214. **POTION** iodée pour prévenir et combattre le ptyalisme mercuriel.

(*Formule de M. Jaurin.* — *Méthode de Knor.*)

| | | |
|---|---|---|
| Iode, | 25 | centigr. |

Faites dissoudre dans :

| | | |
|---|---|---|
| Esprit de vin, | 8 | grammes. |

Ajoutez :

| | | |
|---|---|---|
| Eau distillée de cannelle, | 75 | — |
| Sirop simple, | 15 | — |

(Cette mixture se décomposant par l'action de la lumière, l'auteur préfère la teinture d'iode donnée dans un véhicule mucilagineux à la dose de 5 à 20 gouttes, deux fois par jour. Il a administré avec le même succès l'iode à la dose de 15 centigram. le premier jour, 8 le second et le troisième, 12 le quatrième et le cinquième.)

215. **POUDRE** antidyssentérique de yalhoy;

*Par M. Ruiz.*

| | | |
|---|---|---|
| Ecorces de yalhoy en poudre impalpable, | 1 | scrupule. |
| Sucre en poudre, | 4 | grammes. |

Mêlez pour une dose.

216. **POUDRE** hémostatique de matico;

*Par M. Cazentre.*

| | | |
|---|---|---|
| Poudre de feuilles de matico, | 40 à 80 | centigrammes. |

Mettre en pilules. Pour un jour.

| | | |
|---|---|---|
| Ou bien : Extrait, | 20 à 30 | centigr. |

217. **POUDRE** purgative.

| | | |
|---|---|---|
| Jalap, Rhubarbe, Séné, | ãã | Parties égales. |
| Crême de tartre soluble. | | |

Faites une poudre homogène. Dose : 2 à 6 grammes.

218. **PRÉPARATION** contre les douleurs coexistant avec la syphilis constitutionnelle;

(*Formule de M. Diday.*)

30 à 40 centigrammes d'iodure de potassium en vingt-quatre heures.

Lorsque les douleurs sont très intenses, on prend en même temps :

| | | |
|---|---|---|
| Sulfate de quinine, | 1 | gramme. |
| Extrait thébaïque, | 10 | centigr. |

F. S. A. Dix-huit pilules. A prendre six par jour en trois doses, le matin, à midi, le soir.

219. **PRÉPARATION** spéciale contre les infiltrations séreuses.

(*Formule du docteur Cruveilhier.*)

| | | |
|---|---|---|
| Macération de feuilles de digitale, | 1 | gramme. |
| Eau, | 150 | — |
| Ether nitrique, | 2 | — |
| Sirop des cinq racines, | 30 | — |

220. **SANG** desséché contre l'anémie des enfants.

(*De M. Maulhner.*)

| | | |
|---|---|---|
| Sang de bœuf desséché et pulvérisé, | 10 | grammes. |
| Gomme arabique, | 5 | — |



Digitized by Google

F. S. A. Dix prises à prendre dans de la soupe ou de l'eau. Une à quatre prises par jour.

221. **SIROP** de baume de Tolu.

(*Formule de M. Carré.*)

| | |
|---|---|
| Teinture de Tolu du Codex, | 30 grammes. |
| Sucre, | 1 k° » |

Versez la teinture sur le sucre en agitant avec une spatule, laissez en contact douze heures, ajoutez ensuite 500 grammes d'eau albumineuse et portez à l'ébullition; filtrez à froid.

222. **SIROP** de Cuisinier.

(*Formule de M. Malfilatre.*)

Ce procédé consiste à traiter la salsepareille et les autres substances concassées par la lixiviation à fractionner les produits deux ou trois fois, à commencer l'évaporation des dernières liqueurs obtenues, la continuant par celles qui contiennent le moins de principes actifs jusqu'à ce que le tout soit réduit aux 3/5 du poids du miel et du sucre réunis qui doivent former le sirop. On termine comme dans le Codex, en ajoutant les liqueurs évaporées.

223. **SIROP** de deuto-iodure de mercure ou d'iodhydrargirate de potassium.

(*Formule de M. Mouchon.*)

| | |
|---|---|
| Biodure de mercure, | 5 grammes. |
| Iodure de potassium, | 10 — |
| Eau distillée, | 35 — |
| Sirop de sucre ordinaire, | 2,450 — |

On triture ensemble les deux iodures, on ajoute l'eau distillée, on filtre le soluté salin, et on l'ajoute au sirop froid, et on mêle intimement. 30 grammes de ce sirop (une forte cuillerée à bouche) contient ces deux sels à la dose de 5 centigrammes pour le premier et de 10 pour le second.

224. **SIROPS** éminemment fermentescibles et d'un aspect presque toujours louche; leur préparation;

*Par M. Viel.*

En ajoutant à un soluté quelconque destiné à la préparation d'un de ces sirops, un dixième de son poids d'alcool à trente-un Cartier, on évite la fermentation et on est toujours sûr d'obtenir des produits d'une belle transparence. C'est surtout dans la préparation des sirops d'ipécacuanha, de quinquina, d'absinthe, d'armoise, des cinq-racines, d'erysimum, de cachou, de ratanhia, de safran, etc., dont le plus grand nombre est rarement demandé, que l'auteur conseille d'user de ce procédé.

225. **SIROP** de gomme adragante.

(*Formule de M. Mouchon.*)

| | |
|---|---|
| Gomme adragante, | 15 grammes. |
| Eau, | 1 kilogr. |
| Sirop de sucre, | 3 — |

Faites tuméfier la gomme dans l'eau pendant soixante-douze heures, agitez souvent le mucilage, ajoutez-le au sirop que vous avez chauffé jusqu'à 80 degrés centigrades, en ne le faisant que par petites portions en remuant sans cesse lorsque le mélange est bien homogène. Versez-le sur une toile à mailles peu serrées. Favorisez son passage à l'aide d'une spatule.

226. **SIROP** de gomme à froid;

*Par M. Patrys.*

| | |
|---|---|
| Gomme arabique blanche en poudre, | 750 grammes. |
| Eau de fontaine, | 2 kilogr. |
| Sucre pulvérisé, | 4 — |

Faites dissoudre la gomme à froid, ajoutez le sucre, agitez lorsque la solution est complète, passez à la chausse.

227. **SIROP** de goudron.

(*Formule de M. Carré.*)

| | |
|---|---|
| Goudron liquide, | 125 grammes. |
| Sirop simple chauffé à 45°, | 3 kilogr. |

Introduisez dans une grande bouteille versez dessus le sirop, ou à volonté placez les deux produits au bain marie pendant cinq à six heures, agitez de temps en temps.

On filtre le sirop lorsqu'il est froid.

228. **SIROP** d'iodure d'amidon.

| | |
|---|---|
| Iodure d'amidon soluble, | 25 grammes. |
| Introduisez dans une cornue de verre, versez dessus, eau distillée bouillante, | 333 — |

Bouchez légèrement la cornue, mettez-la sur un feu nu, et après une ébullition

Digitized by Google

de deux minutes au plus, la solution est faite. Mettez d'autre part dans un flacon 665 grammes de sucre blanc finement concassé et tamisé, versez dessus la solution bouillante d'iodure d'amidon, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la rupture du vase.

Le sirop préparé de la sorte, examiné soit à la loupe soit au microscope, ne contient pas de globules en suspension, il est très-limpide et exempt de cette saveur styptique des autres préparations iodurées. Il faut ne préparer ce sirop que par petites quantités, et le conserver dans des flacons bien bouchés.

### 229. SIROP d'iodure d'amidon soluble.

(*Formule de M. Garot.*)

| | | |
|---|---|---|
| Amidon, | 30 grammes. | |
| Iode, | 1 — | 20 centigr. |
| Alcool, | Q. S. | |
| Eau, | 325 grammes. | |
| Sucre, | 644 — | |

Faites cuire l'amidon dans l'eau, fondre le sucre dans l'empois obtenu qui devient fluide, versez le sirop bouillant dans une capsule de porcelaine, ajoutez peu à peu l'iode dissous dans l'alcool et agitez jusqu'au refroidissement.

(*Formule de M. Lassaigne.*)

| | | |
|---|---|---|
| Fécule de pommes de terre, | 1 | centigr. |
| Iode cristallisé, | 1 | — |
| Eau distillée, | 25 | grammes. |
| Sucre en poudre, | 50 | — |

On met dans un petit ballon de verre la fécule et l'eau distillée, on fait bouillir deux ou trois minutes. On retire du feu et on passe sur un filtre humecté. On laisse refroidir. On fait dissoudre l'iode dans le moins d'alcool possible ; on mêle cette teinture à l'empois filtré. On ajoute le sucre et on fait fondre à froid. On conserve à l'abri de la lumière.

(*Formule de M. Brun-Buisson.*)

| | | |
|---|---|---|
| Iodure d'amidon soluble, | 13 | grammes. |
| Triturez avec : | | |
| Eau distillée, | 30 | — |
| Ajoutez : | | |
| Sirop de gomme, | 500 | — |

Le mélange est mis dans une bouteille bouchée, et exposé une heure à la chaleur de 60 degrés au bain-marie en agitant. Conserver à l'abri de la lumière.

### 230. SIROP de phellandre ou de ciguë aquatique.

(*Formule de M. Mouchon.*)

Semence de phellandrium aquaticum, 125 grammes.

Eau bouillante quantité suffisante, pour faire deux infusions et obtenir de liquide 1,500 grammes.

Ajoutez ce liquide à du sirop de sucre, 4,000 grammes, en faisant cuire le sirop et le décuisant par l'infusé.

Le sirop est préparé lorsqu'il ne pèse plus que 4000 grammes.

### 231. SIROP purgatif au jalap;

*Par M. Viel.*

| | | |
|---|---|---|
| Jalap pulvérisé, | 80 | grammes. |
| Alcool à 10°, | 300 | — |
| Sucre grossièrement pulvérisé, | 300 | — |

On met le jalap et l'alcool dans un ballon, on fait digérer pendant cinq à six heures à une température de 30 à 40°, on passe, on filtre, on ajoute le sucre aussitôt qu'il est fondu ; on passe à la chausse, on aromatise et on conserve pour l'usage.

Ce sirop, qui est agréable, purge bien les enfants et se prend à la dose d'une à deux cuillerées à soupe.

### 232. SIROP de reine-des-prés (*spiræa ulmaria*).

(*Formule de M. Kayser.*)

D'une part :

| | | |
|---|---|---|
| Fleurs de reine-des-prés, | 1 | kilogramme. |
| Eau, | Q. S. | |

Pour retirer par distillation.

| | | |
|---|---|---|
| Eau aromatique, | 1 | kilogramme. |
| Sucre blanc pulvérisé, | 2 | — |

F. S. A. un sirop marquant à l'aréomètre 34°.

D'autre part :

Du décocté ci-dessus restant de la distillation des fleurs, Q. S.

| | | |
|---|---|---|
| Herbe de spiræa ulmaria coupée menue, | 1 | kilogramme. |

Faites infuser à vase clos pendant six heures, passez, évaporez la colature, filtrez, ajoutez du sucre blanc, 750 grammes.

F. S. A. un sirop marquant à chaud 32° à l'aréomètre.

Digitized by Google

Mêlez les deux sirops pour obtenir 4 kilogrammes de produit marquant 35° à froid.

Chaque demi-kilogramme de sirop correspond avec le principe actif d'un quart de kilogramme de reine-des-prés.

(*Formule de M. Bonnewyn, pharmac.*)

| | |
|---|---|
| Sommités de spirée coupées, | 250 grammes. |
| Eau bouillante, | 2 kilogram. |
| Sucre blanc, | 4 — |

Faites infuser une demi-heure les sommités, puis faites les bouillir dix minutes, passez avec expression, laissez reposer et ajoutez à la liqueur le double de son poids de sucre.

233. **SIROP** sudorifique avec le carbonate d'ammoniaque.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Ce sirop ordonné par M. Cazenave dans le traitement de la lèpre du psoriasis est le suivant :

| | |
|---|---|
| Sirop sudorifique, | 250 grammes. |
| Sous-carbonate d'ammoniaque, | 10 — |

On en prend d'une à quatre cuillerées par jour, on sait qu'on fait usage de 40 centigr. à 1 gr. 50 centigr. de sel ammoniacal dans une journée.

Le sirop dépuratif de Peyrille contenait aussi du carbonate d'ammoniaque. Ce sirop, dont la formule se trouve dans les anciens Formulaires, se préparait avec :

| | |
|---|---|
| Feuilles de mélisse, | 122 grammes. |
| Follicules de sené, | 15 — |
| Eau, | 1,000 — |

Faisant infuser pendant une heure à une douce chaleur, passant, prenant la colature et ajoutant sucre, 125 grammes.

Faisant dissoudre, puis ajoutant carbonate d'ammoniaque, 4 grammes.

On prend de ce sirop ou plutôt de cette préparation, un demi-verre toutes les six heures.

234. **SOLUTION** d'acétate de potasse contre les maladies de la peau ;

*Par MM. Golding-Bird et J. Easton.*

| | |
|---|---|
| Acétate de potasse, | 50 grammes. |
| Eau, | 1,000 — |

Prendre à la dose de 30 grammes par jour.

235. **SOLUTION** contre la gale.

*Par M. Bodart.*

| | |
|---|---|
| Arséniate de soude, | 1 gramme 20 centig. |
| Sucre, | 30 grammes. |
| Eau distillée, | 400 — |
| Eau de roses, | 100 — |

Préparez selon les règles de l'art.

Avec deux frictions par jour, un galeux est guéri après six ou huit lotions.

236. **SOLUTION** employée contre la blennorrhagie ;

*Par M. Lloyd.*

| | |
|---|---|
| Chlorure de zinc, | 5 centigr. |
| Eau distillée, | 30 grammes. |

237. **SOLUTION** de sulfate de beberine.

| | |
|---|---|
| Sulfate de beberine, | 2 grammes. |
| Acide sulfurique étendu, | 25 gouttes. |
| Sirop, | 32 grammes. |
| Teinture d'écorce d'orange, | 32 — |
| Eau, | 125 — |

Mêlez.

La dose est d'une cuillerée à bouche trois fois par jour.

238. **SOUS-NITRATE** de bismuth à haute dose dans les diarrhées cholériformes.

Sous-nitrate de bismuth, 10 grammes.

Dans les vingt-quatre heures.

239. **SUC** d'ortie employé contre la métrorrhagie.

(*Formule de M. Cazin.*)

100 grammes de suc d'ortie tous les matins et tous les soirs pendant quinze jours.

240. **SUC** de réglisse dit *de Blois*.

| | |
|---|---|
| Extrait de réglisse par infusion, | 280 grammes. |
| Gomme arabique choisie, | 1,000 — |
| Sucre, | 500 — |
| Aunée pulvérisée, | 2 — |
| Iris pulvérisé, | 2 — |
| Huile essentielle de millefeuille ou d'anis, | 40 gouttes. |

On dissout dans Q. S. d'eau la gomme, on la passe à l'étamine, on y dissout le

Digitized by Google

sucre et la réglisse. On rapproche au bain-marie en consistance sirupeuse, on ajoute les poudres et l'huile essentielle et on coule la masse en plaques minces sur un marbre huilé.

Le produit refroidi est coupé en cubes, il est séché et conservé.

### 241. SULFATE de quinine contre l'urticaire compliquée de douleurs articulaires ;

*Par M. le docteur Wickham.*

1 gramme 50 centigr. en trois ou six doses.

### 242. SULFATE de strychnine dans les excrétions involontaires;

*Par M. Girard.*

| | |
|---|---|
| Sirop, | 30 grammes, |
| Sulfate de strychnine, | 2 centigr. |

On fait prendre 7 grammes de ce médicament dont on élève la dose jusqu'à 30 ou 40 grammes lorsque le résultat se fait attendre.

### 243. TABLETTES balsamo-sodiques pectorales ;

*Par le docteur Delioux.*

| | |
|---|---|
| Baume de Tolu, | 150 grammes. |
| Bicarbonate de soude, | 75 — |
| Sucre, | 2,000 — |
| Gomme adragant, | 20 — |
| Alcool à 86°, | 150 — |
| Eau distillée, | 300 — |

En remplaçant le bicarbonate de soude par le bicarbonate d'ammoniaque on a les *tablettes balsamo-ammoniaques.*

### 244. TANNATE de plomb.

(*Formule de M. Angillis-Mortier.*)

| | |
|---|---|
| Acide tannique (dissous dans de l'eau), | 16 grammes. |
| Acétate plombique, | 14,5 — |

### 245. TANNATE de zinc contre la blennorrhagie.

(*Formule de M. Ricord.*)

| | |
|---|---|
| Tannin, | 1 gramme. |
| Sulfate de zinc, | 1 — |
| Eau de roses, | 200 — |

Faites dissoudre.

### 246. TARTRATE neutre de soude cristallisé ; sa préparation ;

*Par M. Viel.*

| | |
|---|---|
| Bicarbonate de soude, | 210 grammes. |
| Acide tartrique, | 180 — |
| Faites dissoudre séparément les sels dans eau, | 1,200 — |

Versez par petite portion la solution de bicarbonate de soude, afin d'éviter le trop grand dégagement du gaz acide carbonique, filtrez et rapprochez jusqu'à réduction approximative des trois cinquièmes, versez chaud dans une terrine et laissez refroidir.

Ce sel, d'un beau blanc cristallise en belles aiguilles ; il est très soluble, d'un goût se rapprochant du sel marin, il est moins désagréable que le sulfate de magnésie et purge aussi bien.

### 247. TEINTURE de cantharides dans le cas d'ulcères rebelles ;

*Par le docteur Tait.*

| | |
|---|---|
| Teinture de cantharides, | 12 gouttes. |
| Teinture de quinquina composée, | 8 grammes. |
| Eau, | 32 — |

### 248. TEINTURE de colchique contre la goutte inflammatoire.

Teinture de semence de colchique de 12 à 18 gouttes quatre fois par jour.

### 249. TEINTURE fébrifuge de Warburg contre les fièvres intermittentes.

Sous ce nom, on emploie en Allemagne, et surtout en Autriche, une préparation composée qui jouit d'une grande réputation comme fébrifuge et dont la composition serait, d'après les travaux de Pach, d'Azelt et de Bikert, la suivante :

| | |
|---|---|
| Aloès hépatique, | 4 grammes. |
| Racine de zédoaire, | 4 — |
| Racine d'Angélique, | 10 centigr. |
| Camphre, | 10 — |
| Safran, | 15 — |
| Esprit-de-vin rectifié, | 100 grammes. |

Faites digérer, et ajoutez à la colature, par 100 grammes :

| | |
|---|---|
| Sulfate de quinine, | 2 grammes. |

à prendre à la dose de 20 grammes par jour.

Digitized by Google

250. **TEINTURE** fébrifuge de l'hôpital de Vienne contre les fièvres intermittentes.

| | | |
|---|---|---|
| Aloès, | 45 | grammes. |
| Camphre, | 6 | — |
| Ecorce d'orange, | 250 | — |
| Racine d'aunée, | 250 | — |
| Alcool rectifié à 0,830, | 7,500 | — |

Faites digérer pendant huit jours, et ajoutez à la liqueur exprimée :

| | | |
|---|---|---|
| Sulfate de quinine, | 125 | grammes. |
| Acide sulfurique, | 750 | — |
| Laudanum de Sydenham, | 45 | — |

Mêlez, filtrez. Le malade prendra 8 grammes de cette teinture avant l'accès.

251. **TEINTURE** contre les punaises ;

*Par Saint-Martin.*

| | | |
|---|---|---|
| Ail reduit en poudre, | 60 | grammes. |
| Assa fœtida, | 10 | — |
| Noix vomique rapée, | 15 | — |
| Euphorbe, | 10 | — |
| Bois de garou, | 12 | — |
| Alcool à 33°, | 500 | — |

Faites macérer pendant 15 jours, passez, filtrez, ajoutez :

| | | |
|---|---|---|
| Camphre, | 40 | grammes. |
| Sublimé corrosif, | 5 | — |

On enduit l'objet qu'on veut purifier avec une brosse trempée cans cette teinture, puis on enflamme l'alcool.

252. **TEINTURE** de spiræa ulmaria;

*Par M. Bonnewyn, pharmacien.*

| | | |
|---|---|---|
| Sommités de spirée finement coupées, | 110 | grammes. |
| Alcool à 23° centigrades, | 40 | — |

Faites macérer huit jours, passez avec expression et filtrez.

253. **TOPIQUE** contre l'herpes ;

*Par M. Cazenave.*

| | | |
|---|---|---|
| Turbith minéral, | 2 | grammes. |
| Soufre sublimé, | 4 | — |
| Cérat de Galien, | 30 | — |

F. S. A.

C'est un des topiques dont il se sert le plus souvent. On peut, au besoin, augmenter la proportion, en portant la dose de turbith minéral à 4 grammes et celle du soufre à 8 grammes.

254. **TRAITEMENT** de l'acné indurata.

(*Formule de M. Néligan.*)

*Pommade.*

| | | |
|---|---|---|
| Iodure de soufre, | 75 centigr. à 2 gr. | |
| Axonge, | 50 grammes. | |

On fait des lotions d'abord avec :

| | | |
|---|---|---|
| Carbonate de soude, | 2 | grammes. |
| Eau, | 500 | — |

(*Formule de M. Cazenave.*)

*Pour lotions.*

| | | |
|---|---|---|
| Eau distillée, | 250 | grammes. |
| Bichlorure de mercure, | 25 à 30 | centig. |

A doses très variables.

| | | |
|---|---|---|
| Hydrochlorate d'ammoniaque, | 15 à 200 | gram. |
| Eau, | 1000 | grammes. |
| Acétate d'ammoniaque, | 60 à 120 | gram. |
| Eau, | 100 | grammes. |

*Pour frictions.*

| | | |
|---|---|---|
| Iodure de soufre, | 1 à 2 | gram. |
| Axonge purifiée, | 30 | grammes. |

255. **TRAITEMENT** des fièvres intermittentes par le sel marin ;

*Par M. Larivière de Batna.*

| | | |
|---|---|---|
| Sel marin. | 15 | grammes. |
| Eau, | 120 | — |

256. **TRAITEMENT** de l'hydrocèle ;

*Par M. Baudens.*

On introduit dans la poche :

| | | |
|---|---|---|
| Eau, | 120 | grammes. |
| Nitrate d'argent, | 5 | centigr. |

257. **TUSSILAGE** à l'anis dit *de Lille.*

| | | |
|---|---|---|
| Anis vert, | 180 | grammes. |
| Fleurs de tussilage récentes, | 125 | — |
| Pied-de-chat, | 8 | — |

Faire une décoction de manière à obtenir 1 kilogramme de liqueur, puis faites dissoudre :

| | | |
|---|---|---|
| Extrait de réglisse par infusion, | 3000 | grammes. |

Faire épaissir au bain-marie, et ajouter :

| | | |
|---|---|---|
| Huile essentielle d'anis, | 12 | grammes. |

Couler en plaques sur un porphyre huilé, et mettre en petits cylindres.

Digitized by Google

258. **VERMIFUGE** Swaims.

(*Remède américain.*)

| | | |
|---|---|---|
| Semen contra, | 60 | grammes. |
| Valériane, | 45 | — |
| Rhubarbe, | 45 | — |
| Spigelie, | 45 | — |
| Agaric blanc, | 30 | — |
| Essence de tanaisie, | 2 | — |
| — de girofle, | 3 | — |

Faites bouillir les cinq premières substances avec une quantité suffisante d'eau pour avoir 3 kilogrammes de décocté; dissolvez les essences dans 1 kilogramme d'alcool, ajoutez au décocté et filtrez.

259. **VIN** de colchique.

(*Formule de M. Deschamps d'Avallon.*)

| | | |
|---|---|---|
| Poudre de bulbes de colchique, | 25 | grammes. |
| Vin sucré et alcoolisé, | 500 | — |

Faites macérer pendant huit jours, passez et filtrez.

1 gramme de ce vin représente le macéré de 5 centigrammes de colchique.

260. **VIN** diurétique majeur;

*Par M. Cruveilhier.*

| | | |
|---|---|---|
| Jalap concassé, | 8 | grammes. |
| Scille concassée, | 8 | — |
| Nitrate de potasse, | 15 | — |

Mêler et faire tremper dans 1 litre de vin blanc pendant un jour.

M. Cruveilhier fait prendre trois cuillerées à bouche par jour de ce vin, deux heures avant le repas. Après deux jours on élève la dose à six cuillerées en trois fois par jour, et après deux jours à neuf cuillerées en trois fois aussi.

Employée contre les hydropisies.

261. **VIN** diurétique mineur;

*Par le docteur Cruveilhier.*

| | | |
|---|---|---|
| Nitrate de potasse, | 12 | grammes. |
| Baies de genièvre, | 60 | — |

Faire macérer pendant vingt-quatre heures dans une bouteille de vin blanc.

M. Cruveilhier fait prendre un verre par jour en trois fois, au moins une heure avant le repas. Le vin est employé seulement contre les enflures œdémateuses des pieds, des jambes, et les hydropisies commençantes.

262. **VIN** stomachique.

(*Formule de M. Deschamps d'Avallon.*)

| | | |
|---|---|---|
| Poudre de calamus aromaticus, | 25 | grammes. |
| Camomille romaine | 25 | — |
| Genièvre, | 25 | — |
| Quassia amara pulvérisé, | 25 | — |
| Quinquina jaune pulvér., | 25 | — |
| Vin alcoolisé et sucré (1), | 1500 | — |

Laissez macérer pendant huit jours, passez et filtrez.

30 grammes de ce vin représentent le macéré de chacune des solutions qui entrent dans la formule de ce vin.

---

(1) Selon M. Deschamps, le vin sucré laisse déposer moins facilement les corps tenus en dissolution. Il dit qu'il serait rationnel de laisser le pharmacien choisir le vin au lieu de lui prescrire le choix de vins généreux, de Bourgogne, de Bordeaux, etc. Voici un *vin normal* qu'il propose : 1000 grammes de ce vin doivent représenter 140 grammes d'alcool absolu ou 14/100e, et si on a à sa disposition du vin à 8/100e, on lui donne la composition voulue en en prenant 825 grammes, et y ajoutant 100 grammes de sucre et 87 gram. d'alcool à 86°.

FIN DES FORMULES.

Digitized by Google

# TABLE DES FORMULES

ET DES

## NUMÉROS SOUS LESQUELS ELLES SE TROUVENT.


| | Numéros des formules. |
|---|---|
| Acide prussique anhydre. (Woehler.) | 1 |
| Alcoolature d'aconit contre la goutte. | 87 |
| Alcoolé de chlorhydrate de fer contre l'érysipèle. (Hamilton et Ch. Bell.) | 88 |
| Amidon contre les maladies de la peau. (Cazenave.) | 89 |
| Antidotes de la strychnine. | 90 |
| Arsenic contre les fièvres. (Boudin.) | 91 |
| Bains contre les rhumatismes. (Smith.) | 92 |
| Bière antiscorbutique. (Van den Corput.) | 2 |
| Bochets divers. (Pétrequin.) | 3 |
| Bols contre l'hématurie. (Avella.) | 93 |
| Cataplasme narcotique. | 4 |
| Cautérisation dans les ophtalmies. (Tavignot.) | 94 |
| Chaulage des blés. | 5 |
| Cigarettes arsenicales contre la laryngite. (Trousseau.) | 6 |
| Colique de plomb. (Bretonneau.) | 95 |
| Collyre contre la rétraction de l'Iris. (Morehouse.) | 96 |
| Collyre au nitrate d'argent. (Tavignot.) | 97 |
| — avec les cantharides. (Tavignot.) | 97 |
| — avec l'iode (Tavignot.) | 97 |
| — au sublimé. (Tavignot.) | 97 |
| — contre les taies de la cornée. (Fronmuller.) | 7 et 8 |
| Cosmétique dentifrice. (Barbier-Bergeron.) | 9 |
| Créosote contre le charbon. (Eutenberg.) | 98 |
| Décoction contre l'arthrite. (Cazin.) | 99 |
| Décoction et poudre hémostatique de matico. (Cazendre.) | 100 |
| Décoction de polygala senega. (Chapman.) | 101 |
| — de racine de Bardane dans la syphilis. (Cazin.) | 102 |
| Eau artificielle de Vichy. | 103 |
| — de goudron. (Cazenave.) | 104 |
| — distillée de roses. (Leguay.) | 105 |
| — purgative gazeuse. (Viel.) | 106 |
| Élixir de Garus. (Société d'Anvers.) | 107 |
| — odontalgique. (Violand.) | 108 |
| Emplâtre agglutinatif de Liége. | 11 |
| — d'euphorbe. (Hainaut.) | 109 |
| Emploi du pain de son contre la constipation. (Goupil.) | 110 |
| Emploi externe de l'ipécacuanha. | 111 |
| — de l'oxyde d'argent. (Throcat.) | 112 |
| — des opiacés contre la fièvre. (Bena Jones.) | 113 |
| Emploi du seigle ergoté contre la paraphlégie. (Gérard.) | 114 |
| Emploi du sumbull. (Pettigren.) | 115 |
| — du tartre stibié. (Aran ) | 116 |
| — du valerianate de zinc. (Bo.) | 117 |
| Émulsion iodée. (Ricord.) | 118 |
| Émulsions purgatives à l'huile de ricin. (Thorel.) | 119 |
| Éther nitrique. (James Grant.) | 12 |
| Extrait de belladone contre la colique saturnine. (Mallierbe.) | 13 |
| Extrait de sang de bœuf. | 120 |


Digitized by Google

| | Numéros des formules. |
|---|---|
| Extrait de viande. (Ván Breslau.) | 121 |
| Fomentation diurétique. (Christison.) | 122 |
| Fomentations avec le vin scillitique contre l'hygroma. (Don Manuel Serrano.) | 123 |
| Formules pour l'administration du tannin. | 124 |
| Formule pour une potion au nitrate d'argent. (Delioux.) | 125 |
| Frictions contre l'acné varioliforme de la face et du col. (Bazin.) | 14 |
| Frictions contre l'acné squameux. (Cazenave.) | 15 |
| Frictions contre la myopie. (Turnbull.) | 85 |
| — de chloroforme dans le tétanos. (Morisseau.) | 126 |
| Frictions contre les péritonites puerpérales. (Vacca.) | 127 |
| Frictions contre les rhumatismes. | 128 |
| Gangrène de la bouche. (Van-Edden.) | 129 |
| Gateau résineux. (Tracet.) | 10 |
| Gouttes lithontriptiques. (Palmieri.) | 16 |
| Huile de Cade contre l'acné varioliforme. (Bazin.) | 17 |
| Huile de foie de morue. (Loge.) | 130 |
| — iodée. (Bourgeois de Faverdaz.) | 131 |
| — iodée pour remplacer l'huile de foie de morue. (Personne.) | 132 |
| Huile iodée médicinale. (Deschamps.) | 133 |
| Infusion antidyssentérique de Yalhoy. (Ruiz.) | 134 |
| Infusion contre la dyssenterie. | 135 |
| — contre la pneumonie. (Ressiguier.) | 136 |
| Injections avec l'alun. (Ricord.) | 143 |
| — contre l'aménorrhée. (Broussonnet.) | 137 |
| Injection contre l'aménorrhée. (Lavagna.) | 138 |
| Injection contre l'aménorrhée. (Nicato.) | 138 |
| — contre l'ascite. (Costes) | 142 |
| — astringentes. (Bodart.) | 141 |
| — contre la blennorrhagie. (Ricord.) | 139 |
| Injections contre la blennorrhagie. (Vidal.) | 140 |
| Injections d'ergotine contre l'épistaxis. (Bonjean.) | 19 |
| Injections iodurées contre les abcès chauds. (Guibourt.) | 18 |
| Iodure d'amidon. (Bonnewyn.) | 20 |
| — d'amidon soluble. (Magnes Laheus.) | 21 |
| Iodure d'amidon soluble. (Brun-Buisson.) | 144 |
| Iodure d'amidon soluble. (Bodart.) | 145 |
| — d'amidon soluble. (Duboy.) | 146 |
| Julep contre la pneumonie. (Sandras.) | 147 |
| Jus de plantain contre les fièvres. (Cheuvreuse.) | 148 |
| Lavement contre la blennorrhagie. (Vidal.) | 153 |
| Lavement contre la colique de plomb. (Aran.) | 22 |
| Lavements contre les flux intestinaux. (Delioux.) | 149 |
| Lavements contre les hernies. (Maeyer.) | 151 |
| — contre l'ivresse. (Lalaux.) | 152 |
| — de yalhoy. (Ruyz.) | 150 |
| Limonade tartro sodique. (Desvignes.) | 154 |
| Liniment contre les brûlures. (Kalt.) | 155 |
| — contre les engelures. | 23 |
| — contre la gale. (Courbassier.) | 156 |
| Liquide préservatif contre la syphilis. (Langlebert.) | 157 |
| Liqueur contre l'épilepsie. (Kœchlin.) | 158 |
| — d'iodure double, d'arsenic et de mercure. (Donovent.) | 24 |
| Liqueur stomachique. (Bossuet.) | 25 |
| Looch huileux. (Thorel.) | 159 |
| Lotions contre l'acné varioliforme de la face et du col. (Bazin.) | 26 |
| Lotions alcalines contre l'acné. (Bazin.) | 160 |
| — contre l'acné indurata. (Cazenave.) | 163 |
| — ammoniacales (Cazenave.) | 164 |
| — antidartreuses. (Néligan.) | 161 |
| — contre l'eczema squameux. (Cazenave.) | 28 |
| Lotions contre la gangrène. (Miquel d'Amboise.) | 162 |
| Lotions contre l'ophtalmie scrofuleuse. (Fronmuller.) | 27 |
| Lupuline contre les érections morbides. (Paye.) | 165 |
| Mélange contre le psoriasis et le prurigo. (Lafond-Gouzé.) | 166 |
| Mélange contre les végétations syphilitiques. | 167 |
| Mixture contre l'épilepsie. | 168 |
| — de fer composée. | 170 |
| — contre le hoquet. (Marage.) | 169 |
| — au sulfate de quinine (Casorati.) | 171 |
| Mixture contre les ulcères atoniques de la jambe. (Hancoek.) | 84 |
| Nitrate d'argent contre la dyssenterie. (Builgnot.) | 172 |
| Onguent basilicum. (Hainaut.) | 173 |
| — mercuriel double. (Motte.) | 174 |
| Opiat contre les flueurs blanches. (Bodart.) | 175 |
| Opium contre la méningite (Bailly.) | 176 |
| Papier antirhumatismal. (Stège.) | 29 |
| Pâte dépilatoire (Félix Boudet). | 30 |
| Petit-lait carbonique. | 31 |
| Pilules contre les affections utérines. (Gendrin.) | 181 |
| Pilules balsamo-alcalines. (Delioux). | 177 |
| — contre la blennorrhagie. (Vidal.) | 179 |
| — diurétiques. (Debreyne.) | 180 |


Digitized by Google

Numéros des formules.

Pilules contre la dysménorrhée. (Tilt). 186
— contre les fièvres. (Degouzée.) 178
— contre les fièvres (Lewis Stuller.) 185
— de goudron. (Cazenave.) 182
— contre la glucosurie. (Berndt.) 32
— contre les maladies de la peau. (Cazenave.) 33
Pilules contre la phthisie (Lecouppey,) 183
— contre la polyblennie pulmonaire chronique. 34
Pilules purgatives. (Champouillon.) 184
— de santoline et de strychnine contre le tœnia. 35
Pilules de soufre brun. (Hannon.) 36
— de soufre brun précipité. (Hannon.) 37
— contre la spermathorrhée par suite de faiblesse éréthistique des organes génitaux. (Wutzer.) 38
Pommade contre l'alopécie. (Stéege.) 47
— antisporique. (Delahaye.) 187
— contre l'acné. (Néligan ) 190
— contre l'acné. (Cazenave.) 191
— contre l'acné. (Bazin.) 192
— dite de Bajard. (Rogé.) 39
— de camomille contre la galle. (Bazin.) 41
Pommade épispastique à l'euphorbe. (Hainaut de Courcelles.) 42
Pommade épispastique. (Bodart.) 194
— contre l'érysipèle. (Gauneau.) 195
— d'extrait de belladone contre les coliques de plomb. (Malherbe.) 40
Pommade contre l'eczèma. ( Lafond-Gouzé. ) 193
Pommade contre la fissure anale. (Campagnac.) 202
Pommade contre la gale. (Van Howendow.) 43
Pommade au goudron. (Cazenave.) 197
— contre l'herpès. (Cazenave.) 203
— à l'huile pyrogénée. (Lafond-Gouzé.) 189
Pommade d'iodure de plomb contre les végétations simples. (Thiry,) 44
Pommade contre les ophtalmies. (Frommuller.) 45
Pommade à l'oyde noir de mercure. (Berensprung.) 198
Pommade contre le prurit. (Tournié.) 188
— contre le prurit. (Cazenave.) 46
— contre le prurit. 196
— au soufre lavé. (Cazenave). 200
— au sulfure de chaux. (Cazenave.) 199
— au turbith minéral. (Cazenave.) 201
— de la veuve Farnier. (Viel.) 204
Potion contre l'angine tonsillaire aiguë. (Moris.) 50
Potion antiasthmatique. 51

Numéros des formules.

Potion antiscrofuleuse. ( Hufeland et Crawford.) 49
Potion balsamique contre les écoulements. (Thivy.) 52
Potion contre la chorée. (Barlow.) 207
— contre la colique de plomb. (Brachet.) 208
Potion contre la coqueluche. (Hôpital des Enfants.) 48
Potion contre la danse de Saint-Guy. 205
— contre le délire alcoolique. (Vidart.) 56
Potion contre le *delirium tremens* des blessés. (Jobert.) 54
Potion contre la diarrhée. (West.) 209
— employée dans les couches. (Bouchacourt.) 213
Potion contre la fièvre typhoïde. 57
— d'hydrochlorate d'ammoniaque contre la fièvre. (Aran.) 211
Potion contre les névralgies. (Hogg.) 58
— contre les névralgies. (Hogg.) 60
— iodée contre le ptyalisme mercuriel. (Jaurin.) 214
Potion contre le purpura hémorrhagica. 206
— contre le rhumatisme aigu. (Worms.) 59
Potion contre la sciatique. (Schneider.) 61
— contre les spasmes, les coliques nerveuses, les coliques menstruelles, l'hystérie, les névralgies. (Lebrou.) 53
Potion contre la suette miliaire. (Baudon.) 210
Potion contre les suites d'accouchements laborieux. (Vanoye.) 55
Potion contre le tænia. (Budd.) 212
Poudre antidyssentérique de Yalhoy. (Ruiz.) 215
Poudre contre les affections scrofuleuses. (Benecke.) 64
Poudre contre la coqueluche. 62
— contre les écoulements. (Thiry.) 63
— hémostatique de matico. (Cazentre.) 216
Poudre purgative. 217
Préparation de caféïne-citrate, citrate de fer et de caféïne lactate, malate, sirop de malate de caféïne, solution chlorhydrique, tablettes de caféïne. (Van den Corput.) 65
Préparation de citrate de fer et de magnésie, sirop de citrate de fer et de magnésie, pastilles de citrate de fer et magnésie. (Van den Corput.) 66
Préparations diverses avec l'eau de mer. (Leriche et Pasquier.) 69
Préparation contre les douleurs de la syphilis constitutionnelle. (Diday.) 218


Digitized by Google

| | Numéros des formules. |
|---|---|
| Préparation de l'eau d'Enghien artificielle. (Barruel,) | 67 |
| Préparation contre les infiltrations séreuses. (Cruveilhier.) | 71 |
| Préparation contre les infiltrations séreuses. (Cruveilhier.) | 219 |
| Préparations du jusée. (Ernest Barruel.) | 86 |
| — du soufre brun, céral, pommade, onguent. (Hannon.) | 68 |
| Préparation au sulfure de carbone contre la goutte (Wulger.) | 72 |
| Sang contre l'anémie des enfants. (Maulhner.) | 220 |
| Savonule d'huile de foie de morue. (Delahaye.) | 73 |
| Sirop de baume de Tolu. (Carré.) | 221 |
| — de Cuisinier. (Malfilâtre.) | 222 |
| — de ciguë aquatique. (Mouchon.) | 230 |
| Sirops fermentescibles. (Viel.) | 224 |
| Sirop de gomme adragante. (Mouchon.) | 225 |
| Sirop de gomme à froid. (Patrys.) | 226 |
| — de goudron. (Carré.) | 227 |
| — d'iodure d'amidon. (Magnes-Lahens.) | 74 |
| Sirop d'iodure d'amidon. | 228 |
| — d'iodure d'amidon soluble. (Brun-Buisson.) | 229 |
| Sirop d'iodure d'amidon. (Lassaigne) | 229 |
| — d'iodure d'amidon. (Garot.) | 229 |
| — d'iodhydragirate de potassium. (Mouchon.) | 223 |
| Sirop purgatif au jalap. (Viel.) | 231 |
| — de reine des prés. (Kayser.) | 232 |
| — de reine des prés. (Bonnewyn.) | 232 |
| — sédatif pour faciliter la dentition des enfants et prévenir les convulsions. | 75 |
| Sirop sudorifique de carbonate d'ammoniaque. (Cazenave.) | 233 |
| Solution d'acétate de potasse contre les maladies de la peau. (Golding-Bird et J. Easton.) | 234 |
| Solution d'aconit contre les accès de goutte. (Pritterich.) | 76 |
| Solution contre la blennorrhagie. (Lloyd.) | 236 |
| — contre la gale. (Bodard.) | 235 |
| — de sulfate de bébérine. | 237 |
| Sous-nitrate de bismuth contre les diarrhées. | 238 |
| Suc d'ortie contre la métrorrhagie. (Cazin.) | 239 |
| Suc de réglisse dit de Blois. | 240 |
| Sulfate de quinine contre l'urticaire. (Wickham.) | 241 |
| Sulfate de strychnine contre les excrétions involontaires. (Girard.) | 242 |
| Tablettes balsamo-sodiques pectorales (Delioux.) | 243 |
| Tannate de plomb. (Augillis-Mortier.) | 244 |
| — de zinc contre la blennorrhagie. (Ricord.) | 245 |
| Tannin contre les affections oculaires. (Haision.) | 77 |
| Tartrate neutre de soude cristallisé. (Viel.) | 246 |
| Teinture de cantharides contre les ulcères. (Tait) | 247 |
| Teinture de colchique contre la goutte. | 248 |
| — fébrifuge de Warburg contre les fièvres. | 249 |
| Teinture fébrifuge de l'hôpital de Vienne contre les fièvres. | 250 |
| Teinture de gingembre contre la myopie. (Turnbull.) | 78 |
| Teinture contre les punaises. (Saint-Martin,) | 251 |
| Teinture de spiræa ulmaria. (Bonnewyn.) | 252 |
| Tisane employée contre l'asthme. (Debreyne.) | 79 |
| Topique contre les arthrites, les hydarroses et les tumeurs blanches. | 80 |
| Topique contre la colique de plomb. (Aran.) | 81 |
| Topique contre l'herpes. (Cazenave) | 253 |
| Traitement de l'acné indurata. (Néligan.) | 254 |
| — de l'acné indurata. (Cazenave.) | 254 |
| — des fièvres par le sel marin. (Larivière de Batna.) | 255 |
| Traitement de l'hydrocèle. (Baudens) | 256 |
| Tussilage à l'anis dit de Lille. | 257 |
| Vermifuge Swaims. | 258 |
| Vomitif et mixtures contre le croup laryngé. (Trousseau.) | 83 |
| Vinaigre cosmétique et sanitaire. (Cottam.) | 82 |
| Vin de colchique. (Deschamps d'Avallon.) | 259 |
| — diurétique majeur. (Cruveilher.) | 260 |
| — diurétique mineur. (Cruveilher.) | 261 |
| — stomachique. (Deschamps d'Avallon.) | 262 |


Digitized by Google

# NOMS DES AUTEURS

## DES FORMULES

## DU SUPPLÉMENT AUX FORMULAIRES.


| | Numéros des formules. |
|---|---|
| Angillis-Mortier. | 244 |
| Aran. | 22, 81, 116, 211 |
| Avella. | 93 |
| Bailly. | 176 |
| Barbier-Bergeron. | 9 |
| Barlow. | 207 |
| Barruel. | 68, 86 |
| Baudens. | 256 |
| Baudon. | 210 |
| Bazin. | 14, 17, 26, 41, 160, 192 |
| Bena (Jones). | 113 |
| Beneke. | 64 |
| Berensprung. | 198 |
| Bo. | 117 |
| Bodart. | 141, 145, 175, 194, 235 |
| Bonjean. | 19 |
| Ronnewyn. | 20, 232, 252 |
| Bossuet. | 25 |
| Bouchacourt. | 213 |
| Boudet (Félix). | 30 |
| Boudin. | 91 |
| Bourgeois. | 131 |
| Brachet. | 208 |
| Bretonneau. | 95 |
| Broussonnet. | 137 |
| Brun-Buisson. | 144, 229 |
| Budd. | 212 |
| Butignot. | 172 |
| Carré. | 221, 227 |
| Casorati. | 171 |
| Cazenave. | 15, 28, 33, 46, 89, 90, 104, 163, 164, 182, 191, 197, 199, 200, 201, 203, 216, 233, 253, 254. |

| | Numéros des formules. |
|---|---|
| Cazentre. | 100, 216 |
| Cazin. | 99, 102, 239 |
| Champagnac. | 202 |
| Champouillon. | 184 |
| Chapman. | 101 |
| Cheuvreuse. | 148 |
| Christison. | 122 |
| Costes. | 142 |
| Cottam. | 82 |
| Courbassier. | 156 |
| Cruveilhier. | 71, 219, 260, 261 |
| Debout. | 73 |
| Debreyne. | 79, 180 |
| Degouzée. | 178 |
| Delioux. | 125, 149, 177, 243 |
| Delahaye. | 73, 187 |
| Deschamps. | 133 |
| Deschamps-d'Avallon. | 259, 262 |
| Desvignes. | 154 |
| Diday. | 218 |
| Don Manuel Serano. | 123 |
| Donovant. | 24 |
| Duboys. | 146 |
| Easton. | 234 |
| Eulenberg. | 98 |
| Fronmuller. | 7, 8, 27, 45 |
| Gauneau. | 195 |
| Garot. | 229 |
| Gendrin. | 181 |
| Gérard. | 114 |
| Girard. | 242 |
| Golding-Bird. | 234 |
| Grant (James). | 12 |


Digitized by Google

| | Numéros des formules. |
|---|---|
| Guibourt. | 18 |
| Hainaut. | 42, 109, 173 |
| Haision. | 77 |
| Hamilton et Charles Bell. | 88 |
| Hancoek. | 84 |
| Hannon. | 36, 37, 69 |
| Hogg. | 58, 60 |
| Hufeland et Crawford. | 49 |
| Jaurin. | 214 |
| Jobert. | 54 |
| Kayser. | 232 |
| Lafond-Gouzi. | 166, 189, 193 |
| Lalaux . | 152 |
| Langlebert. | 157 |
| Larivière. | 255 |
| Lassaigne. | 229 |
| Lavagna. | 138 |
| Lebrou. | 53 |
| Lecouppey. | 183 |
| Leguay. | 105 |
| Leriche et Pasquier. | 70 |
| Lewis-Stuller. | 185 |
| Lloyd. | 236 |
| Loge. | 130 |
| Maeyer. | 151 |
| Malfilatre. | 222 |
| Magnes-Lahens. | 21, 74 |
| Malherbe. | 13, 40 |
| Marage. | 169 |
| Marchousse. | 96 |
| Maulliner. | 220 |
| Miggues. | 80 |
| Miquel d'Amboise. | 162 |
| Moris. | 50 |
| Morisseau. | 126 |
| Motte. | 174 |
| Mouchon. | 223, 225, 230 |
| Néligan. | 161, 190, 254 |
| Nicato. | 138 |
| Palmieri. | 16 |
| Patrys. | 226 |
| Paye. | 165 |
| Personne. | 132 |
| Pettigren. | 115 |
| Pétrequin. | 3 |
| Prittericli. | 76 |
| Ressiguier. | 136 |
| Ricord. | 139, 143, 245 |
| Rogé. | 39 |
| Ruiz. | 134, 150, 215 |
| Sandras. | 147 |
| Saint-Martin. | 251 |
| Schneider. | 61 |
| Smith. | 92 |
| Steege. | 29, 47 |
| Stokes. | 67 |
| Tait. | 247 |
| Tavignot. | 94, 97 |
| Thiry. | 44, 52, 63 |
| Thorel. | 119, 159 |
| Throcat. | 112 |
| Tilt. | 186 |
| Tournié. | 188 |
| Tracet. | 10 |
| Trousseau. | 6, 83 |
| Turnbull. | 72, 78, 85 |
| Vacca. | 127 |
| van Brelau. | 121 |
| Van den Corput. | 2, 65, 66 |
| Van Edden. | 129 |
| Van Hawendowk. | 43 |
| Vanoye. | 55 |
| Vidal. | 140, 153, 179 |
| Vidart. | 56 |
| Viel | 106, 204, 224, 231, 246. |
| Violand. | 108 |
| West. | 209 |
| Wickham. | 241 |
| Woehler. | 1 |
| Worms. | 59 |
| Wulger. | 72 |


Digitized by Google

***Pour paraître dans le courant du mois de février 1852.***

# TRAITÉ

DE

# TOXICOLOGIE

**PAR M. ORFILA,**

Professeur et ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, Membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique, Haut Titulaire de l'Université, etc.

CINQUIEME ÉDITION,

**Revue, corrigée et considérablement augmentée.**

2 très-forts volumes in-8° de plus de 900 pages chacun.

# TRAITÉ

PRATIQUE ET RAISONNE

# D'HYDROTHÉRAPIE

RECHERCHES CLINIQUES

Sur l'application de cette médication au traitement des congestions sanguines chroniques du foie, de la rate, de l'utérus, des poumons et du cœur; des névralgies et des rhumatismes musculaires; de la chlorose et de l'anémie; de la fièvre intermittente; des déplacements de la matrice; de l'hystérie, des ankyloses, des tumeurs blanches, de la goutte; des maladies de la moelle, des affections chroniques du tube digestif, etc.;

PAR

**Le docteur Louis FLEURY,**

Médecin de l'établissement hydrothérapique de Bellevue, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, et l'un des auteurs du *Compendium de médecine*.

1 volume in-8°.

Paris. — Typogr. de E. et V. PENAUD frères, rue du Faub.-Montmartre, 10.

8° 7655

Digitized by Google